

Phyt.
40

40

Lebanino Schreber inter
Botanicae nuptiae suae
a. Benthoni

Phyt. 40.

Bertoloni



Gluc. nat

S. 16

Phyt. N. 168.

<36629117080018

S

<36629117080018

Bayer. Staatsbibliothek

E

PLANTAE GENUENSES

QUAS

ANNIS MDCCCII--MDCCCIII

OBSERVAVIT , ET RECENSUIT

ANTONIUS BERTOLONI. M.D.

SOC. MED. ÆMUL. GEN. SOD.

R₂


GENUÆ MDCCCIV.

Typis Societatis Æmulationis.

PLANTAE GENUINAE

QUAS

ANNO 1800



ANNO 1800

ANNO 1800

MONACENSIS

ANNO 1800



ANTONIOUS BERTOLINI M.D.

EX LIBRIS MUSEI HIST. NAT. MONAC.



EX LIBRIS MUSEI HIST. NAT. MONAC.

Typis Societatis Aemulatiois.



JOANNI BAPTISTAE BALBIS IN ATHEN. TAURIN.

MAT. MED. ET BOT. PROFES. -- HORT.

PUBL. ET MUS. RER. NAT. DIRECT. -- ACCAD.

TAURIN. -- SOC. MED. ÆMUL. GEN. SODALI.



Ad illustrandas australis Europæ stirpes nihil utilius, nihil aptius excogitari profectò posset, quàm siquis in Ligusticam Floram concinnandam sedulò incumberet. Sed frustra, præclare Balbis, me ad subeundum opus non hisce ferendum humeris sæpe per litteras excitaveras; satis sit, si pauculas observationes super Genuenses plantas biennio ferè a me lectas in lucem edam, ut, quæ major est doctrinarum supellex, eæ incitamento sint ad arduum explendum inceptum. Perspicuitati, et brevitati

studens rariores tantum species describo, cunctis adjecta indubiâ, quoad potui, synonymiâ. Parum fidens antiquiorum auctorum iconibus malas expuli; hæ in caussa sunt, cur tot adhuc supersint scientiæ aberrationes nunquam evasuræ, nisi conflato ad hanc normam Pinace. Accipe, eximie patriæ Botanices cultor, parvulum hoc observantiæ meæ pignus, et, qua incepisti erga me comitate, favere pergas.

AUCTOR.

JOHANNES BAPTISTA RABINUS DE AINEN. TABERN.

Med. M.D. et Bot. P.H. — Hort.

Publ. et M.D. Res. Nat. Direct. — Acad.

TABERN. — Soc. Med. et Nat. Gen. Soc.

Ad illustrandas auctoris Europæ stipites
 alibi notis, nihil apud exegit prole
 possit, quoniam idem in lignis con-
 tinuandam adhibere debet. Sed fructus, que-
 clare habile, me ad sublegendum opus non hinc
 ferendum humeris aspe per litteras excutere;
 satis sit, si parvitas observationes super Co-
 menses plantas pueris fore a me lectas in his
 com edam, ut, quæ major est doctrinarum
 aspellex, et incrementis sint ad artem ex-
 plendum incipit. Peripetati, et pueri

DIANDRIA MONOGYNIA.

1. **VERONICA** *hederifolia* : foliis cordato-rotundatis , tri-quinquelobis : calycibus fructus clausis , foliolis cordato-acutis : capsulis glabris .

V. *hederifolia* *Sp. pl.* 19. --- *Smith Fl. Brit. I. pag.* 24. --- *Desfont. Fl. Atl. I. pag.* 14. --- *Savi Fl. Pis. I. pag.* 16. --- *Soc. Med. d' Emul. di Gen. tom. I. secon. quad. pag.* 74.

In hortis Genuensibus ubique . *Annua* .

Caules diffusi . Folia tri-quinqueloba , lobo terminali majore . Pedunculi nunc foliis breviores , nunc paullulum longiores . Foliola calycina cordato — acuta , margine ciliata , cœterum glabra , fructificationis tempore capsulæ approximata , hinc calyx pyramidatus . Corolla calyce minor , vel cœrulea , fauce albida , et striata , vel tota albida . Capsula glabra , et in reliquis ut in sequenti .

2. **VERONICA** *cymbalaria* : foliis cordato-rotundatis , subseptemdentatis : calycibus fructus patentibus , foliolis ovatis : capsulis hirsutis . *N. Soc. Med. d' Em. di Gen. tom. I. sec. quadr. pag.* 74.

V. *hederifolia* *β Sp. pl.* 19.

In muris hortorum ubique , copiosè in pomario *Durazzo a Cornigliano* . *Annua* .

Caules teretes , diffusi , ramosi , e muris dependentes , ultra pedem usque longi . Rami oppositi , patentes . Folia petiolata , cordato-rotundata et ferè semicircularia , margine instructa septem , interdum vel quinque vel novem , dentibus obtusis , quorum

medius est paullulum major; cæterum folia sunt subcarnosa, declinata, inferiora opposita, superiora alterna. Petioli sulcati, stricti. Pedunculi tenues, nudi, foliis longiores, florente planta erecti, fructificationis tempore declinati ut semina in muris abscondant. Calyx constans quatuor foliolis ovatis, obtusis, aut vix acutis, fructificante planta patentissimis, undique pubescentibus. Corolla calyce major, limbo alba, fauce viridis, idque constanter. Capsula hirsuta pilis longiusculis, depressa, quadri-loba, bivalvis, bilocularis, loculo quovis bilobo, unum aut duo semina fovente.

Tota planta plus minus hirsuta; dum in aprico orta est, *Parietariae offic.* ad instar caulibus, et inferior foliorum pagina rubent.

Nullum dubium hanc constituere speciem, nec varietatem, postquam Smithius in *Flora Britannica* dixit "*V. hederifolia* β . Linn. species revera distincta, gaudet lacinnis calycinis ellipticis, obtusis, undique hirtis, nec ciliatis." *tom. I. pag. 25.*

3. *VERBENA officinalis*: tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule sub-solitario *Smith Brit. 2. p. 600* --- *Sp. pl. 29.* --- *Desfont. Atl. I. pag. 16.* --- *Savi Pis. I. pag. 18* --- *Bull. Her. de la France tab. 215.*

Verbena communis cœruleo flore. *Hort. Rom. 3. tab. 56.*

In viis campestribus. *Annua.*

4. *SALVIA verbenaca*: foliis serratis sinuatis leviusculis, corollis ealyce angustioribus. *Sp. pl. 37* --- *Savi Pis. I. pag. 20.* --- *Desf. Atl. I. p. 21* --- *Smith Brit. I. p. 31.*

Horminum sylvestre floribus dilutè azureis in

- verticillum dispositis. *Hort. Rom. 3. tab. 18.*
Gallitrichum flore minore purpurascente, et
 rubro *I. Bauh. 3. lib. 28 p. 313.*
 Ubique in viciniis Genuæ. *Peren.*
 Mirè ludit foliorum sinubus; hinc variet. A.
 B. C. *Flor. Atlan.* Apud nos tamen planta
 citatis iconibus respondens semper occurrit.
 5. *SALVIA glutinosa*: foliis cordato-sagittatis
 serratis acutis. *Sp. pl. 37.*
Salvia montana maxima, foliis hormini, flo-
 re flavescente *Hort. Rom. 3. tab. 21.*
 Secus torrentem *Leira a Voltri. Peren.*
 Caulis tetragonus, erectus, basi radicans. Fo-
 lia opposita, cordato-sagittata, auriculis
 divaricatis, acuminata, serrata, petiolata.
 Bracteæ integræ. Flores pedunculati, sub-
 seni in quovis verticillo. Calyx pubescens,
 glutinosus, labio superiore integro, infe-
 riore bidentato. Corolla ampla, pallidè lu-
 tea, extus pubescens, et glutinosa, intus
 glabra. Labium superius falciforme, bifidum;
 labium inferius fauce adpersum maculis
 rubris, trilobum, lobis rotundatis, latera-
 libus integris, declinatis, medio longiori,
 sursum verso, margine crispo et crenulato.
 Filamenta inferne appendiculata. Stigma
 exertum. Tota planta pubescens, pilis in
 parte florifera apice glandulosis, et gluten
 fundentibus.

DIANDRIA DIGYNIA.

6. *ANTHOXANTUM odoratum*: spica ovato-
 oblonga, flosculis subpedunculatis aristâ
 longioribus. *Sp. pl. 40. — Smith Brit. I. p.*
31. — Savi Pis. I. p. 23. — Desf. Atl. I.
p. 25. — Leers Herb. tab. 2. fig. 1. bene—
Lam. Illus. des gen. tab. 23. fig. 2

Ubique locis gramineis collium Genuensium.
Peren.

TRIANDRIA MONOGYNIA

7. VALERIANA *rubra*: floribus monandris caudatis; foliis lanceolatis integerrimis. *Sp. pl.* 44. — *Smith Brit. I. p. 37.* — *Savi Pis. I. p. 25.* — *Desf. Atl. I. p. 27.* — *Lam. Illus. tab. 24. fig. 2.*

Valerianoides latifolia flore rubro. *Hort. Rom. 2. tab. 17.*

V. rubra. *Dod. Pempt: 351.*

Ubique in mœniis Genuæ, et in muris campestribus. *Peren.*

Floribus albis hîc loci nondum vidi.

8. IRIS *pseudacorus*: corollis imberbibus: petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Sp. pl.* 56. — *Savi Pis. I. p. 36.* — *Smith Brit. I. p. 41.* — *Pollich Palat. I. p. 32.* — *Bull. Herb. de la France tab. 37.*

In aquosis a *Sestri di Levante.* *Peren.*

9. SCHOENUS *mucronatus*: culmo tereti nudo, spicis fasciculatis divaricatis, involucri triphylo subulato. *Sp. pl.* 63. — *Desf. Atl. I. p. 41.*

Scirpus maritimus capite glomerato. *Scheuchz. Agr. p. 367. tab. 8. fig. 1.*

Juncus maritimus. *Lob. ic. 87.*

In littore a *Pegli.* D. GRIOLET. *Perenn.*

Tota planta viridi-glaucâ.

10. SCHOENUS *nigricans*: culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphylli valvulâ alterâ subulatâ longâ. *Sp. pl.* 64. — *Savi Pis. I. p. 39.* — *Smith Brit. I. p. 43.*

Juncus lævis minor, panicula glomerata ni-

gricante. *Moris. Ox. s. 8. t. 10. f. 28.*
 Locis humidis montis *Ramazzo, Gneo, Acqua-*
Santa. Perenn.

11. *CYPERUS longus*: culmo triquetro folioso,
 umbellâ foliosâ decompositâ; pedunculis
 nudis, spiculis alternis. *Smith Brit. I. pag.*
47 --- Sp. pl. 67 --- Desfont. Atl. I. p. 43.
--- Savi Pis. I. p. 40.

Cyperus longus odoratus major panicula spar-
 sa speciosa. *Moris. Ox. s. 8. t. 11. f. 13.*
 benè.

Cyperus odoratus, radice longa, seu *Cyperus*
officinarum. Scheuchz. Agr. p. 378. tab.
8. f. 12.

Genuæ in canali, ubi sunt officinæ pulveris
 pyrii. *Perenn.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

12. *PHALARIS canariensis*: panicula ovata spi-
 ciformi, glumis calycinis navicularibus in-
 tegris, corollâ quadrivalvi. *Smith Brit. I.*
p. 62 --- Sp. pl. 79 --- Savi Pis. I. p. 52.
--- Desf. Atl. I. p. 55 --- Lam. ill. tab. 42.
fig. I.

Genuæ all' *Acquasola* locis gramineis. *Ann.*

Vagina supremi folii ventricosa. Glumæ ova-
 tæ in panicula spiciformi ovata. Radix fi-
 brosa.

13. *PHALARIS aquatica minor. Savi Pis. I.*
p. 54.

Gramen typhynum phalaroideum minus bul-
 bosum aquaticum. *Barrel. ic. 700. fig. 2.*
 benè.

Genuæ in canali supra il *Lagazzo. Perenn.*

Radix constat duobus vel tribus parvis bul-

bis superimpositis , et catenatis . Culmi triquadripedales . Panicula spiciformis cylindrica , parum ultra pollicem longa . Glumæ lanceolatae , angustiores quàm in *Ph. canariensi* , cui cæterum similes . *Phal canariensis* citò distinguitur statura humiliori , radice fibrosa , spica ovata , glumis ovatis .

14. *PANICUM verticillatum* : spicâ verticillatâ ; spiculis quaternis , involucellis unifloris bisetis scabris , culmis diffusis . *Smith Brit. I. p. 64 --- Sp. pl. 82 --- Savi Pis. I. p. 63 --- Desf. Atl. I. p. 57.*

Gramen paniceum spica aspera simplici . *Morris. Ox. s. 8. t. 4. f. 11 .*

Genuæ in hortis et vineis . *Ann.*

Setis flosculorum sursum strictu asperrimis , et admotis vestibis adhærentibus facile a *Panico viridi et glauco* distinguitur , quibus simillimum .

15. *PANICUM viride* : spica cylindrica ; spiculis confertis , involucellis bifloris , multisetosis scabriusculis ; corollâ leviusculâ . *Smith Brit. I. p. 65 --- Sp. pl. 83. --- Savi Pis. I. p. 64 --- Desf. Atl. I. p. 58. --- Leers herb. tab. 2. f. 2.*

In fossis sub *Albaro* . *Ann.*

Setæ flosculorum sursum strictu glabræ , deorsum verò scabriusculæ , nec admotis vestibis adhærentes . Spica viridis .

16. *PANICUM crus galli* : spicâ decompositâ ; spiculis alternis conjugatisque subdivisis , calycibus aristatis hispidis , rachi subquingulari . *Smith Brit. I. p. 65 --- Sp. pl. 83 --- Savi Pis. I. p. 65 --- Desf. Atl. I. p. 58 sine varietate .*

Gramen paniceum s. panicum sylvestre spicâ

divisâ. *Moris. Ox. s. 8. t. 4. f. 15.*
benè.

A Sestri di Ponente, Pegli secus viam publicam. Ann.

17. *PANICUM dactylon*: spicis digitatis basi interiore villosis, floribus solitariis, calycibus æqualibus corollæ alternis, sarmentis repentibus. *Smith Brit. I. p. 67, --- Sp. pl. 85 --- Savi Pis. I. p. 68.*

Gramen dact. folio arundinaceo minus. *Moris: Ox. s. 8. t. 3. f. 4.*

Genuæ in littore *alla Foce* sub mœniis. *Peren.*

18. *PHLEUM crinitum*: paniculâ spicatâ, glumis linearibus basi subventricosis hispidis aristatis: aristis capillaceis longissimis. *Smith Brit. I. p. 71.*

Alopecurus Monspeliensis. Sp. pl. 89.

Santia plumosa. Savi Mem. di Matem. e Fisic. della Soc. Ital. tom. 8. part. 2. pag. 479. a

Polypogon monspeliense. Desf. Atl. I. p. 67. sine var. A.

Gra. alopec. maj. spica viresc. divulsa pilis longior. *Barrel. ic. 115. f. 2.*

Genuæ secus aquæductum *allo Zerbino* -- *Rarum. Ann.*

19. *MILIUM lendigerum*: paniculâ subspicatâ, floribus aristatis. *Sp. pl. 91. --- Smith Brit. I. p. 76. --- Desf. Atl. I. p. 65.*

Agrostis panicea. Enc. --- Savi Pis. I. p. 83.

Agrostis australis. Linn. Mant. I. 30.

A. ventricosa. Gouan Hort. Monsp. p. 39. n. I. cum icone mala.

Gramen alopecuro accedens ex culmi geniculis spicas cum petiolis longiusculis promens.

Pluk. Phyt. T. 33. f. 6. melior.

Genuæ in collibus *al Lagazzo. Ann.*

Panicula florescentiæ tempore laxiuscula ,
et ventricosa . Glumæ calycinæ margine al-
bido -- scariosæ , dorso nunc glabræ , nunc
pubescentes . Calyx basi ventricosus , ibi-
que nitidus , et pallidè luteolus , veluti
si milii granum foveret . Flosculus quatuor
vel quinque vicibus calyce brevior , pilo-
sus præcipuè supernè . Gluma floralis major
dorso aristata ; arista calyce paullulum lon-
gior , geniculata .

Non excludenda certè ab hac specie cum Des-
fontainesio icon Pluknetii .

20. AGROSTIS *vulgaris* : panicula patente :
ramulis divaricatis capillaribus , calycibus
æqualibus , petalo interiore duplo brevior
retuso . *Smith Brit. 1. p. 79.*

Agrostis capillaris. Leers herb. tab. 4. f. 3.
bene .

Genuæ sub *lo Sperone* intus mœnia . *Peren.*
Glumæ calycinæ muticæ , subæquales , uni-
floræ , carinâ sæpe corpusculis , scabrâ .
Gluma floralis major calyce paullulum
brevior , altera gluma calyce dimidio mi-
nor , ut vix distinguatur . Panicula pri-
mum stricta florescentiæ tempore patet ,
quo elapso iterum contrahitur . Culmus etiam
bipedalis , erectus . In speciminibus aliunde
habitis vidi petalum majus calyci fere
æquale .

21. AGROSTIS *stolonifera* *β. Sp. pl. 93.*

Gramen radice repente , paniculâ densâ , spi-
catâ , spadiceo-viridi , locustis exiguis mu-
ticis . *Scheuchz. Agrost. pag. 130. n. 4.*
cum bona descriptione .

Passim circum Genuam ; giganteam vidi in
canali prope sepulcretum *alla Foce. Peren.*

Panicula erecta, alternatim semiverticillata; ramuli ab imo ad summum flosculis densissimè teguntur.

22. MELICA *nutans* : petalis imberbibus, paniculâ coarctatâ secundâ subsimplici, floribus pendulis, calyce bifloro. *Smith. Brit. 1. p. 92. --- Sp. pl. 98.*

Gramen avenaceum, tenui spicataque panicula albis utriculis. *Barrel. ic. 96. f. 2.*

Genuæ frequens in via quæ ducit ad Lagazzo. *Perenn.*

Culmi a tribus quatuorve pollicibus ad sesquipedem longi. Folia siccatione involvuntur. Stipula sesquilinearis ferè, apice truncata; nulla appendix oppositifolia ad oram vaginæ. Panicula subsimplex, nunc stricta, nunc laxiuscula, e flosculis raris, nutantibus, unilateralibus, alternis, breviter pedunculatis; interdum panicula est simplicissima, interdum unum alterumve ramum infernè gerit. Glumæ calycinæ inæquales, et flosculis breviores, præcipuè minor; obtusiusculæ, sæpius dorso rubro-violaceæ, margine albidæ, nitidæ. Flosculi tres, alterni, distichi; terminalis sterilis, parvus, turbinato-truncatus; inferior sessilis, longior, et minori calycis glumæ respondens. Glumæ florales obtusiusculæ, inæquales, glabræ, nitidæ, albidæ, vel apice rubroviolaceæ. Descripsi plantam locis siccioribus ortam.

23. MELICA *coerulea* : petalis acutis imberbibus, paniculâ coarctatâ, floribus erectis cylindricis. *Smith. Brit. 1. p. 93. --- Linn. Mant. 2. 325. --- Pollich Palat. 1. p. 80.*
Aira coerulea *Sp. pl. 95. --- Leers herb. tab. 4. f. 7.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore, ex viridi nigricante. *Scheuchz.*

Agr. p. 207. n. 1. tab. 4. f. 11. 12.

Reperitur Genuæ sub altiori jugo *de' due fratelli* versus *il Diamante*, et in montibus *di Voltri* supra *l' Acqua Santa* locis humidioribus. *Peren.*

Variat plurimum, altitudine culmorum; iisdem in locis vidi vix bipedalem, et humanam altitudinem æquantem. Panicula cærulea, nunc strictissima, nunc laxa. Supervacaneum prorsus est ex diversa culmorum altitudine, vel flosculorum tenuitate varietates statuere; hinc pertinent ad hanc plantam sequentia quoque *Scheuchzeri* synonyma.

Gramen arundinaceum enode, montanum, paniculâ longissimâ, locutis angustissimis. *Scheuchz. Agr. 208. n. 2.*

Gramen arundinaceum enode, minus, sylvaticum *Scheuchz. Agr. 209. n. 3.*

24. *SESLERIA coerulea*: spica ovato -- oblongâ, imbricatâ, bracteis alternis. *Smith Brit. 1. p. 94 --- Scop. Car. ed. 2. tom. 1. 63 --- Lam. illus. tab. 57. f. 1.*

Cynosurus cœrueus. Sp. pl. 106.

Gramen glumis variis *C. B. Prodr. 21. cum icone* bona quoad herbam, rudi quoad flores.

Frequens in monte *Ramazzo a Sestri di Ponente. Peren.*

25. *POA fluitans*: paniculâ ramosâ divaricatâ, spiculis adpressis teretibus multifloris, flosculis obtusis septemnerviis basi duplicato -- nervosis. *Smith Brit. 1. p. 95.*

Festuca fluitans Sp. pl. 111 --- Savi Pis. 1.

p. 119. --- *Desfont. Atl.* 1. p. 87. --- *Leers herb. tab.* 8. f. 5.

Gramen miliaceum aquaticum brizæ locustis , semine ruffo . Barrel. ic. 7.

Gramen loliaceum fluitans spica longissima divisa . Moris . Ox . 5. 8. t. 3. f. 16.

Genuæ in fossis valli ad portam Pila. Peren.

Culmus crassus , compressus , anceps , infernè radicans.

26. *POA rigida* : paniculâ lanceolatâ distichosecundâ coarctatâ glabrâ; rachi marginatâ , spiculis septemfloris , flosculis teretibus enervibus. *Smith. Brit.* 1. p. 99. --- *Sp. pl.* 101. --- *Savi Pis.* 1. p. 98 --- *Desfon. atl.* 1. p. 74.

Gramen arvense , filicina duriori panicula gracilius . Barrel. ic. 49.

Genuæ in mœniis , et in muris campestribus . Ann.

27. *POA bulbosa* ? . *Sp. p.* 102.

Gramen vernum , radice ascalonica . Vail. Bot. Paris. pag. 91. *tab.* 17. *f.* 8.

• *Sp. pl.* 102.

Gramen murale junceum minus allii radice paniculâ janthinâ non crispa . Barrel. ic. 272.

Gramen arvense paniculâ crispâ janthinâ fol. geniculatis minus . Barrel. ic. 703. *fig.* 1.

Gramen arvense paniculâ crispâ pallidâ seu majus . Barrel. ic. 703. *f.* 3.

Gramen arvense paniculâ crispâ . C. B. Prodr. pag. 6. cum icone bona .

Utraque varietas promiscuè reperitur Genuæ in viis d' Oreggina e del Lagazzo , a Sestri di Ponente in plateis prope littus. Peren. Floret Aprili .

Radix fibrosa , albida , ex qua confertim plures res nascuntur quidam veluti bulbuli , tunicis albicantibus , aut ex albido fuscis , membranaceis , pluribus , quæ foliorum vaginæ sunt , ad unciam fere unam exporrectis vestiti , qui vel foliorum fasciculos , vel etiam culmos producunt (a) “ . Culmus erectus , teres , geniculatus , tenuis , palmaris , pedalis , glaber , superne nudus . Folia brevissima , linearia , glabra , canaliculato — compressa , marginibus tenuissimè et creberrimè ciliatis , scabrisque ; caulina pauca , breviora , latiora , vaginis prælongis , striatis . Stipula albo — scariosa , sesquilineam longa , acuminata . Panicula florescentiæ tempore patens , ramis sub-flexuosis , binatis , uno alterove solitario . Spiculæ latè ovatæ , acuminatæ , compressæ , subturgidulæ , sesquilineam circiter longæ , 4 — 5 floræ , viridi — purpurascentes , glumarum marginibus albo-scariosis . In quavis spicula flosculi superiores sunt minores . Glumæ calycinæ æquales , ovatæ , acutæ , trinerves , carinâ supernè corpusculis scabrâ , margine albo-scariosæ , nec sericeæ , totâ spiculâ paululum breviores . Gluma floralis exterior ovata , acuta , dorso marginibusque pubescens , basi villis complicatis cum reliquis flosculis connexa . Antheræ luteæ , lineares . Tota planta subglauescens , rarò verè glauca .

Rectè Smithius (b) conjungit varietates 2

(a) Scheuchz. Agr. 185. (b) Fl. Brit. 1. p. 102.

et γ *Poa bulbosæ* *Sp. pl.* 102. licet α sit planta æstiva culmis semper inclinatis distincta, γ autem vernalis, et culmo erecto perpetuò incedens?

- β Panicula plantæ superius descriptæ adeo tota degenerat, ut flosculi transeant in bulbos. Hic tamen transitus fit per varios gradus, ut sæpe locustæ vix immutatae partim adhuc floriferae partim bulbiferae conspiciantur, sæpe vero omnino bulbiferae et crispæ evadant; hinc diversæ Barrelierii icones, quæ omnes bonæ pro vario metamorphoseos gradu; nec species distincta hæc varietas censi potest, ut innuit Smithius in *Flora Britannica*.

28. *POA angustifolia*: paniculâ diffusâ, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Sp. pl.* 99 --- *Leers herb. tab.* 6. f. 3. bene paniculam exhibet.

Poa pratensis β *Smith Brit.* 1. p. 104.

Gramen pratense, paniculatum majus, angustiore folio. *Scheuchz. Agr.* 178. n. 3.

Genuæ *all' Acquasola* locis gramineis. *Peren.*

Folia inferiora pedalia, et ultra, nunc dimidiam lineam, nunc lineam lata, semper longa. Stipula brevissima truncata. Culmi sesquipediales, bipediales. Panicula densa. Spiculæ majores, minores, seu quinquefloræ, vel trifloræ pro ratione loci natalis. Flosculi basi villis complicati.

29. *POA annua*: paniculâ divaricatâ, spiculis ovatis, flosculis remotiusculis quinquenerviis liberis, culmo obliquo compresso. *Smith Brit.* 1. p. 105. --- *Sp. pl.* 99 --- *Desfont. atl.* 1. p. 72. --- *Savi Pis.* 1. p. 97. --- *Leers herb. tab.* 6. fig. 1.

Gramen pratense minimum album . *Moris.*

Ox. 5. 8. *t.* 5. *f.* 21.

Genuæ ubique in hortis . *Annu.*

30. *BRIZA maxima* : annua , spiculis subcordatis , perpaucis , multifloris , pedunculis simplicibus . *Enc — Sp. pl.* 103 — *Savi Pis* 1. *p.* 108 — *Desf. atl.* 1. *p.* 77.

Gramen phalaroides majus ferruginea nutante panicula . *Barrel. ic.* 15. *fig.* 1.

Gramen tremulum maximum . *Moris.* *Ox.* 5. 7. *t.* 6. *f.* 48.

Genuæ in collibus *al Lagazzo.* *Ann.*

Spiculæ plurimum variant numero flosculorum . Glumæ calycinæ sæpe rubro — ferrugineæ ; glumæ florales albidæ , quarum exterior nunc glabra , nunc pubescens .

31. *DACTYLIS glomerata* : paniculâ secundâ supradecompositâ glomeratâ . *Smith Brit.* 1. *p.* 111 — *Sp. pl.* 105. — *Desf. Atl.* 1. *p.* 79. — *Lamar. ill. tab.* 44. *fig.* 1. — *Leers herb. tab.* 3. *f.* 3. bene .

Festuca glomerata. *Savi Pis.* 1. *p.* 111.

Gr. paniculâ. torosâ pratense asperum . *Moris.* *Ox.* 5. 8. *t.* 6. *f.* 38.

Gramen spicatum folio aspero . *C. B. Prodr.* pag. 9. cum bona icone .

Ubique Genuæ locis gramineis . *Peren.*

32. *CYNOSURUS aureus* : paniculæ spiculis sterilibus pendulis ternatis , floribus aristatis . *Sp. pl.* 107 — *Desfon. atl.* 1. *p.* 83.

Gr. sciurum seu alopecurum minus heteromallâ paniculâ . *Barrel. ic.* 4. ruditer .

Genuæ in mœniis *alla Darsena.* *Ann.*

Radix fibrosa . Culmi unus plures ex eadem radice , tecti vaginis foliorum valde laxis .

Folia lanceolata , acuminata , glabra , vel

pubescentia , acutissimè carinata , carina in vaginam decurrente. Stipula albo -- scariosa , obtusa , crenato --- lacera , lineam semis , vix lineam longa , in vaginæ margines decurrens . Panicula spiciformis , terminalis , lutescens , densa , unilateralis , ramulis brevibus , strictis. In apice cujusvis pedicelli sunt tres bracteæ spiciformes , angustissimæ , steriles , veluti umbellatæ ; earum calyx constat duabus glumis angustissimis , setaceis , subæqualibus , excipientibus sex circiter glumas steriles , alternas , distichas , imbricatas , solitarias , muticas , truncatas , apiceque latiores , pallidè luteolas , et sæpe dorso pulchrè rubellas . In centro harum bractearum spiciformium sunt flores hermaphroditi optimè a Linnæo in *Sp. pl.* , et a Desfontainesio l. c. descripti . Singularis hæc florum fabrica nonne distinctum posceret genus ?

33. *FESTUCA duriuscula* : paniculâ secundâ diffusâ , flosculis aristatis , culmo tereti (striato) , foliis caulinis planis , radice fibrosa. *Smith Brit. I. p. 115. a. -- Sp. pl. 108* --- *Leers herb. tab. 8. f. 2* --- *Pollich Palat. I. pag. 101. descr. bona.*

Nil communius Genuæ locis gramineis. *Peren.* Culmus teres , striatus , ab uno ad tres pedes altus. Spiculæ variant magnitudine , et numero flosculorum , sæpe tamen sexfloræ ; nunc virides sunt , nunc ex-viridi-cærulescentes. Flosculi omnes aristâ lineam longâ terminati. Herba tenax.

34. *FESTUCA phleoides* : panicula spiciformi , stricta , pubescente ; flosculis summis mu-

ticis, inferioribus aristatis; gluma interna florali bifida.

F. phleoides. Desf. *Atl. I. p. 98. tab. 23*

--- *Soc. Med. d' Emul. di Gen. tom. 2.*

primo quadr. pag. 135.

Bromus trivialis. Savi *Pis. I. p. 124. tav. 2.*

f. 2. ex speciminibus invicem cum auctore communicatis.

Poa phleoides. Lam. *ill. n. 976.*

Frequens Genuæ in viis campestribus. *Ann.*

Culmi unus aut plures ex eadem radice, ad-

scendentes, geniculati, sæpe ramosi, pal-

lum, pedem longi. Folia linearia, acu-

minata, angusta, pubescentia vel glabra,

vaginis interdum margine longitudinali tan-

tum ciliatis. Stipula albo-scariosa, trun-

cata, lacera. Panícula terminalis, spicifor-

mis, stricta, cylindrica, a semipollice ad

duos pollices longa. Pedunculi brevissimi,

ramosi, pubescentes. Spiculæ compressæ, bi-

septemfloræ, duas circiter lineas longæ. Glu-

mæ calycinæ muticæ, inæquales, dorso vi-

rides, et pubescentes, margine albo-scario-

sæ; major concava, acuta, totâ spiculâ paul-

lo brevior; minor angustior. Glumæ flora-

les inæquales; exterior dorso viridis, pu-

bescens vel glabra, margine albo-scariosa,

cæterum concava, acuta, in flosculis infe-

rioribus terminata aristâ, vel potius setulâ

tenui, albâ, lineam circiter longâ, in su-

perioribus mutica. Gluma interior albo-sca-

riosa, mutica, bifida, et prorsus tecta ab

exteriori. Filamenta tenuissima, capillaria,

vix conspicua. Anthera parvæ, albida,

oblongiusculæ.

Post editam Decadem primam plantarum Li-

gusticarum ex speciminibus cum Cl. Savi
invicem communicatis patuit identitas *Bromi*
trivialis, et *Festucæ phleoidis*. Hæc in
Pisano solo humidiori, et fertiliori maxi-
mè luxuriat, ut videre est in icone *Floræ*
Pisanae ad naturam, licèt ruditer, facta.

35. *BROMUS mollis*: paniculâ erectâ coarctatâ;
pedunculis ramosis, spiculis ovatis, flos-
culis imbricatis depressis nervosis pubescen-
tibus. *Smith. Brit. I. p. 126* — *Trans. Linn.*
Soc. 4. p. 284 — *Sp. pl. 112* — *Desf. Atl.*
I. p. 93 — *Leers herb. tab. 11. f. 1.*

β. culmo humillimo, paniculâ pauciflorâ. *Smith*
l. c.

Communis Genuæ locis herbidis, præcipuè *al-*
l' Acquasola. β. in littore *a Sestri di Ponente*.
Bienn.

36. *BROMUS erectus*: paniculâ erectâ; pedun-
culis subsimplicibus, flosculis lanceolatis
teretiusculis, foliis radicalibus angustissimis
ciliato-pilosis. *Smith Brit. I. p. 131* —
Trans. Linn. Soc. 4. p. 290.

Bromus agrestis. Allion. Ped. 2. p. 249.

Gramen bromoides pratense, foliis præter
culmum angustissimis ciliato-pilosis. *Scheu-*
chz. Agr. p. 255. tab. 5. f. 13.

Nil communius Genuæ locis gramineis, præ-
cipuè *al Lagazzo. Perenn.*

Culmus teres, striatus, erectus, a sesquipe-
de ad tres pedes altus, geniculatus, glaber,
raro pubescens. Folia radicalia longissima,
et angusta, raris longisque pilis ciliata, cau-
lina latiora, omnia subglaucescentia, stria-
ta, duriuscula, arefactione involuta. Stipu-
la brevissima, truncata, lacera. Panicula
stricta; pedunculi simplices, ramosique,

inæquales, apice incrassati, superiores breviores. Spiculæ perfectæ lanceolato-divergentes, 6 -- 8 -- floræ, viridi -- purpurascens, glabræ vel pubescentes. Glumæ calycinæ vix inæquales, muticæ, nervosæ, margine albo-scariosæ, altera latior, trinervis, altera angustior, et paullulum brevior uninervis. Glumæ florales æquales; exterior apice leviter bifida, et ex sinu emittens aristam unam vel duas lineas longam, trinervis, nervis scabris, margine albo-scariosa; interior mutica, apice subdentata, scariosa, alba, vel ex-albo-spadicea, ad oram circumdata nervo viridi, et adeo minutissimè ciliato, ut vix oculis nudis cognoscatur. Antheræ plusquam duas lineas longæ, ante maturitatem croceæ indivisæ, dein purpureæ, extremitatibus divergentibus.

37. *BROMUS sterilis*: panicula nutante subsimplici, flosculis lanceolatis nervosis sulcatis, foliis pubescentibus. *Smith Brit. I. p. 134.* -- *Trans. Linn. Soc. 4. p. 295* -- *Sp. pl. 113* -- *Desf. Atl. I. p. 94* -- *Leers herb. tab. 11. fig. 4.*

Festuca graminea annua sterilis, spicis dependentibus. Mor. Ox. s. 8. t. 7. f. 11.

Communis Genuæ in muris campestribus, hortisque. *Ann.*

38. *BROMUS sylvaticus*: spica simplici nutante secunda, spiculis sessilibus teretiusculis, aristis glumâ longioribus, foliis pilosis. *Smith Brit. I. p. 136* -- *Trans. Lin. Soc. 4. p. 300* -- *Savi Pis. I. p. 126* -- *Pollich Palat. 1. p. 118.*

Genuæ in collibus allo Zerbino. *Peren.*

Calycis glumæ nunc muticæ , nunc breviter aristatæ .

39. *BROMUS pinnatus* : spica simplici erecta disticha , spiculis sessilibus teretiusculis , aristis glumâ brevioribus , foliis nudiusculis . *Smith Brit. I. p. 137 --- Trans. Lin. Soc. 4. p. 301 --- Sp. pl. 115 --- Savi Pis. I. p. 127.*

Gramen sparteum , spicata brizæ panicula , et corniculata. *Barrel. ic. 25. præcipuè spicula solitaria et prima .*

Genuæ ubique locis gramineis. *Perenn.*

40. *BROMUS distachyos* : spiculis sessilibus , erectis , compressis approximatis ; arista terminali .

B. distachyos. Sp. pl. 115. et 1677. excl. Barrel. syn. --- Desf. Atl. I. p. 96.

Festuca ciliata. Gouan Hort. Monsp. p. 48. n. I. cum optima icone , excl. syn. , quod ipse auctor fecit in appen. p. 547.

Bromus spiculis sub-binatis , compressis sessilibus. Gerard Gallopr. p. 98. n. 6. tab. 3. fig. I.

- ℓ. Spicis pluribus 5 --- 6.

Bromus distachyos. Savi Pis. I. p. 127.

Festuca gracilis paucis utriculis. Barrel. ic. 83. fig. 2.

Genuæ in collibus *al Lagazzo. β. in littore alla Foce , tum a Sestri di Ponente. Ann.*

41. *AVENA fatua* : paniculata ; calycibus subtrifloris , flosculis omnibus aristatis , et infernè hirsutis.

A fatua Sp. pl. 118 --- Smith Brit. I. p. 139. --- Soc. Med. d' emul. di Gen. tom. 2. prim. quadr. pag. 138 --- Leers herb. tab. 9 f. 4.

Gramen avenaceum lanuginosum utriculis la-

nugine flavescens. Scheuchz. Agr. 241.
n. 2.

8. spiculis omnibus bifloris.

Avena fatua. Ardui. Sag. Scient. e Lett. dell' Accad. di Pad. tom. 2. p. 109. tav. 3.

Genuæ ubique. Ann.

Radix fibrosa. Culmus erectus, bi - tri - pedalis, geniculatus. Folia linearia, acuminata, pilosa, scabriuscula, interdum glabra. Stipula brevis, obtusa, crenata. Panicula rara, pyramidalis, patens. Pedunculi simplices vel ramosi, capillares; apice incrassati, scabri, nutantes, inferiores oriuntur plures ex eodem loco. Spiculæ pendulæ, ut plurimum trifloræ, flosculis sessilibus, pedunculatisque, pedicellis hirsutis. Glumæ calycinæ fere æquales, floralibus longiores, octo novem lineas longæ, concavo - lanceolatæ, acuminatæ, viridi - striatæ, margine albo - scariosæ. Gluma floralis exterior bifida, in omnibus flosculis infernè hirsuta setis straminei coloris, dorsoque infra ipsius medietatem gerens aristam calyce duplo longiorem, nudam, geniculatam, deorsum scabram, sub geniculo contortam, et senescendo nigricantem. Arista intermedii flosculi brevior, interdum brevissima. Gluma floralis interior minor, acuta, mutica, albo - scariosa, margine inflexo, nervo viridanti minutè et densissimè ciliato prope oras circumdata.

42. AVENA *sterilis* : paniculata ; calycibus subquadrifloris, flosculis exterioribus aristatis, et infernè hirsutis, interioribus muticis glabris.

A. sterilis. *Sp. pl.* 118 --- *Soc. Med. d^r emul. di Gen. tom. 2. pri. quadr. pag. 140.*

Gramen avenaceum utriculis lanugine flavescens. *Scheuchz. Agrost. 239. n. 1. tab. 5. fig. 1.*

Genuæ in collibus *al Lagazzo*. *D. GRIOLET allo Zerbino. Ann.*

Tota planta *A. fatuae* habitu longè major. Spiculæ tri--quadrifloræ; floribus sessilibus pedunculatisque. Glumæ calycinae pollicem et ultra longæ. Duo flosculi exteriores aristati, aristis interdum sub geniculo pubescentibus, infernè hirsuti setis straminei coloris. Flosculi interiores mutici, unà cum pedicellis glabri, raro uno alterove pilo adpersi. In reliquis, servata majori proportionem, convenit cum præcedente.

43. *AVENA flavescens* paniculâ ramosissimâ laxâ, calycibus subtrifloris inæqualibus, receptaculis pilosis, foliis planis subpubescentibus. *Smith. Brit. 1. p. 142. --- Sp. pl. 118. --- Desf. Atl. 1. p. 101. --- Savi Pis. 1. p. 131. --- Ardui. Sag. Scient. e lett. dell' Accad. di Pad. tom. 2. pag. 119. tav. 6. fig. 2.*

Gr. avenaceum spica sparsa flavescens, locustis parvis. *Moris. Ox. s. 8. t. 7. f. 42.*

Genuæ ubique locis gramineis. *Peren.*

44. *ARUNDO ampelodesmon*: foliis radicalibus planis, margine scabris, acutis, caulinis vaginantibus convolutis, paniculâ secundâ. *Cyris. Plant. rar. Reg. Neap. fasc. 2. tab. 12.*

A. Festucoides: foliis asperis, striatis; floribus paniculatis; spiculis compressis, sub-

quadrifloris ; glumis mucronatis . *Desf.*
Atl. 1. p. 108. tab. 34.

A. mauritanica . *Poir. itin.* 2. p. 104.

A. tenax. *VVilld. Sp. pl.* 1. p. 455.

In insula *Tiro Lunensis* portus . *D. VIVIANI*
 in monte *Portofino* . *Peren.*

Folia arefactione involvuntur , radicalia densè cæspitosa . Culmus 5 — 6 pedes altus . Panicula sæpius unilateralis . Glumæ calycinæ inæquales , lanceolatae , acuminato — subulatae , bi — quadrifloræ , flosculis paululum breviores . Gluma floralis exterior acuminato — subulata , basi villosa , interior minùs acuta , nunc brevior , nunc subæqualis . Glumæ sæpe cærulescunt .

Cur recentiores Botanici synonym. Cyrilli , qui primus de hac planta diffusè doctèque egit , silentio prætermittunt ?

45. *LOLIUM perenne* : spicâ muticâ , spiculis calyce longioribus , flosculis lanceolatis .
Smith Brit. 1. p. 148. — *Sp. pl.* 122. —
Savi Pis. 1. p. 140. — *Leers herb. tab.*
 12. fig. 1. — *Lam. ill. tab.* 48. fig. 1.

Genuæ ubique ; *all' Acquasola* præcipue occurrit spiculis paucifloris . *Peren.*

Spica sursum strictu glabra , longa , e spiculis alternis distichis , approximatis , ita ut paullo infra , ubi spicula desinit , opposita incipiat . Rachis alternè scrobiculata ad excipiendas spiculas . Flosculi mutici lanceolato — subulati , acuti . Spiculæ 4 - 10 - floræ , nunc longè , nunc parum calyce breviores .

46. *ROTBOLLIA incurvata* : spica tereti subulata , glumâ calycinâ subulatâ adpressâ bipartitâ . *Smith Brit.* 1. p. 151. — *Linn.*

Suppl. 114 --- *Cyrl. Pl. rar. Reg. Neap. fas.* 1. *tab.* 6. *fig.* A --- *Cavanil. Ic. et Descr.* 3. *pag.* 7. *n.* 235. *tab.* 213. --- *Desf. Atl.* 1. *p.* 110. sine var. A --- *Savi Pis.* 1. *p.* 143.

Aegilops incurvata. *Sp. pl.* 1490.

A Sestri di Ponente in littore. *Ann.*

47. *HORDEUM bulbosum*: spicâ deorsum scabrâ; flosculo hermaphrodito aristato, masculis muticis, subpedicellatis; radice tuberosa.

H. strictum. *Desf. Atl. tom.* 1. *pag.* 113. *tab.* 37.

H. bulbosum. *Sp. pl.* 125. ex *Desf.* in emendationibus ad calcem primi voluminis *Fl. Atl.*

Genuæ frequens in pascuis all' *Aquasola*, *Zerbino*, *Lagazzo*. *Peren.*

Radix e duobus vel tribus tuberibus coarctatis. Aristæ vel adpressæ vel laxiusculæ pro diverso ætatis gradu. Spica sursum strictu glabra, deorsum valdè scabra. Reliqua omnino ut in descriptione et icone *Desfontainesii*.

48. *HORDEUM murinum*: flosculis lateralibus masculis aristatis, glumis calycinis intermediis lanceolatis ciliatis. *Smith Brit.* 1. *p.* 155 --- *Sp. pl.* 126 --- *Desf. Atl.* 1. *p.* 112. --- *Savi Pis.* 1. *p.* 147.

Gramen hordeaceum minus et vulgare. *Scheuchz. Agr.* 14. *n.* 1.

Genuæ ubique. *Ann.*

49. *TRITICUM festuoides*: spica secunda, simplici; spiculis subsexfloris aristatis, calycibus muticis.

Festuca maritima . *Sp. pl.* 110. excl. Scheuchz. syn.

Triticum hispanicum . *Reich. Syst. plant.* 1. p. 240. n. 8. --- *Wild. Sp. pl.* 1. p. 479.

A Sestri di Ponente in initio littoris Genuam versus . *Ann.*

Culmi plures ex eadem radice , a duobus ad octo pollices longi , erecti , striati . Folia tenuia , brevia , citò convoluta , vaginis valdè striatis . Stipulâ brevis truncata , lacera . Spica terminalis , secunda , stricta , simplex . Rachis leniter flexuosa , hinc nuda , plana ; hinc , quâ florifera est , angulo valdè acuto dirempta , ita ut spiculæ , licèt secundæ , ad acutissimum angulum sint inter se se inclinatæ . Spiculæ alternæ , distichæ , solitariae , lanceolatae , compressæ , subsexfloræ , subpedicellatæ , sic dissitæ , ut , quâ una desinit , opposita incipiat . Glumæ calycinæ subæquales , muticæ , spiculâ dimidio circiter breviores . Glumæ florales subæquales , exterior terminata aristâ tenuissimâ , lineam circiter longâ ; interior mutica . Tota planta glaberrima . Facies *Festucæ* .

50. *TRITICUM loliaceum* : calycibus obtusis multifloris , spicâ simplici secundâ , flosculis muticis culmo ramoso . *Smith Brit.* 1. p. 159. --- *Willd. Sp. pl.* 1. p. 483.

Gramen parvum marinum spicâ loliaceâ . *Moris . Ox . s. 8. t. 2. f. 6.*

A Sestri di Ponente in littore . Genuæ in mœniis sub *la Lanterna* . *Ann.*

Culmi plures ex eadem radice , ab una ad quatuor uncias longi , ex--decumbenti--erecti , vel toti decumbentes , nunc simplices ,

nunc infernè ramosi, striati, subcompressi .
Folia linearia , acuminata , striata , va-
ginantia , lineam circiter lata . Stipula
truncata , lacera , semilineam , vel lineam
longa . Spica terminalis , secunda , stri-
cta , simplex , interdum infernè ramosa .
Rachis flexuosa , hinc convexa , nuda ,
hinc qua parte florifera est , angulo obtu-
siusculo divisa , ita ut spiculæ parum in-
ter se se sint inclinatæ . Spiculæ distichæ ,
alternæ , solitariæ , interdum una vel alte-
ra ex inferioribus , sed non infima , gemi-
nata , lanceolata , compressæ , 4 --- 8 ---
floræ , subpedicellatæ , crebræ , ita ut a
medietate unius oriatur opposita . Glumæ
calycinæ subæquales , spiculâ dimidio cir-
citer breviores , muticæ . Glumæ florales
obtusiusculæ , muticæ , inæquales . Tota
planta glaberrima . Facies *Poae* .

TRIANDRIA TRIGYNIA .

51. *POLYCARPON tetraphyllum* : *Sp. pl.*
131. --- *Smith Brit. 1. p. 162.* --- *Savi*
Pis. 1. p. 154 --- *Desfont. Atl. 1. p. 115* ---
Lam. ill. tab. 51.
Anthyllis alsinæfolia polygonoides major .
Barrel. ic. 534.
Genuæ in semitis . *Ann.*

TETRANDRIA MONOGYNIA .

52. *GLOBULARIA vulgaris* : caule herbaceo ;
foliis radicalibus spathulatis subdentatis ,
caulinis lanceolatis ,
G. vulgaris . Sp. pl. 139. --- *Savi Pis. 1.*
p. 157.
Aphyllantes Anguillare sive globularia Bel-

- lidi similis . *I. Bauh. hist. 3. lib. 25. pag. 13.*
- Globularia . *Clus. hist. lib. IV. pag. VI.*
- Genuæ in collibus supra *Oreggina . Peren.*
53. SCABIOSA *leucantha* : corollulis quadrididis æqualibus , squamis calycinis ovatis obtusis , foliis pinnatifidis . *Sp. pl. 142.*
- Scabiosa alba Belgicorum hortorum . *Clus. hist. lib. 4. pag. iij.*
- Scabiosa montana calidarum regionum *Lugd. hist. 2. p. 1110.*
- Nil communius Genuæ in collibus supra *Oreggina , allo Sperone , et viciniis . Peren.*
- Caulis teres , erectus , cubitalis et ultra , striatus , ramosus , glaber . Folia coriacea , profundè pinnatifida , lacinia impari majore ; foliorum inferiorum lacinia ovata , acuminata , serrata , sæpe villosula , superiorum lineares subintegre , glabræ . Florum capituli terminales , albi , odori . Involucrum universale capitulo brevius , constans foliolis ovatis , obtusis . Corollulae uniformes , quadrididæ , lacinia longiori , extus pubescentes ; unaquæque distincta bractea ovata obtusa , albidâ , scariosâ . Stamina alba . Semina pubescentia , angulosa , supernè crassiora , brevi margine piloso -- lacero coronata . Calyx proprius fit ex urceolo viridi , pubescente , limbo lacero .
54. SCABIOSA *arvensis* : corollulis quadrididis radiantibus , foliis pinnatifidis incisis , caule hispido . *Smith Brit. 1. p. 170 --- Sp. pl. 143. -- Savi Pis. 1. p. 164.*
- Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum . *Moris . Ox. s. 6. t. 13. f. 1.*

Genuæ in altiori monte *de' Due Fratelli*.
Peren.

55. SCABIOSA *columbaria* : corollulis quinquefidis radiantibus ; foliis radicalibus ovatis , dentatis ; caulinis pinnatifidis , superiorum laciniis linearibus , elongatis .

S. columbaria . *Sp. pl.* 143. --- *Smith Brit.* 1. p. 171. --- *Desfont. Atl.* 1. p. 120 --- *Savi Pis.* 1. pag. 165.

Phyteuma Dioscoridis . *Col. Phytob. edit. Pl.* pag. 79. tab. 22.

β. Sp. pl. 144.

Scabiosa minor vulgaris . *I. Bauh. hist.* 3. lib. 25. pag. 3. et 4.

Scabiosa capitulo globoso minor . *Moris. Ox.* s. 6. t. 14. f. 21.

Genuæ locis herbidis humilioribus ubique ;
β in collibus supra *Oreggina* passim .
Peren.

Folia radicalia indivisa , oblonga ; in petiolum attenuata , dentata ; successiva pinnatifida , laciniis apice dilatatis , dentatis , vel incisissimis ; caulina superiora laciniis linearibus , elongatis , integerrimis ; ultima subsimplicia . Tota planta viridis , leviter pubescens . *β* differt solum tenuitate partium , sataque dedit speciem .

56. SCABIOSA *pyrenaica* . albo - tomentosa , mollissima ; foliis radicalibus ovatis dentatis ; caulinis superioribus bipinnatifidis , laciniis brevibus , linearibus .

Scabiosa pyrenaica . *Allion . Ped.* 1. pag. 140. n. 512. tab. 25. f. 2. --- *VVilld. Sp. pl.* 1. p. 552.

Scabiosa tomentosa . *Vitm. Sum. plant.* 1. pag. 285.

Frequentissima in montibus supra *l'Acqua Santa a Voltri*, et in monte *Ramazzo*, ubi foditur pyrites ad parandum sal anglicum, seu sulphas magnesiæ. *Peren.*

Folia radicalia indivisa oblonga, in petiolum attenuata, dentata; successiva pinnatifida, laciniis latis, dentatis, incisive; caulina superiora bipinnatifida, laciniis lineari-setaceis, brevibus, crebris. Tota planta albo-tomentosa, tactu molliissima; reliqua ut in *Sc. columbaria*.

Culta in hortis ludit foliis superioribus pinnatifidis tantum, laciniis latioribus.

Ex speciminibus a CL. BALBIS communicatis certior factus sum de identitate stirpis Allioni, et meæ: icon enim *Florae Pedemontanae* non refert exactè plantam.

57. *SHERARDIA arvensis*: foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Sp. pl.* 149. — *Smith Brit.* 1. p. 171. — *Savi Pis.* 1. 169. — *Lam. ill. tab.* 61.

Asperula flore carneo acuto folio. *Barrel. Ic.* 541. fig. I.

Ubique locis herbidis. *Ann.*

58. *GALLIUM mollugo*: foliis octonis ellipticis obtusiusculis mucronatis margine scabris, floribus paniculatis divaricatis. *Smith Brit.* 1. p. 178. — *Sp. pl.* 155. — *Savi Pis.* 1. p. 175. *Bull. Herb. de la France tab.* 283.

Mollugo. *Dodon. Pempt.* 354. — *Clus. hist. lib. V. pag.* CLXXVI.

Genuæ ad aquæductum D' Oria, et sub *lo Sperone*. *Peren.*

Caules flaccidi, exacte quadranguli, glabri, ad genicula incrassati. Folia verticillata, lanceolata, seu potius longè elliptica,

marginibus tenuissimè ciliato -- serrulatis deorsum strictu scabris ; inferiora suboctona . Rami patentes . Flores albi in panicula terminali , cujus rami primarii sunt oppositi , altero sæpius brevior . Semina glabra .

59. **GALLIUM** *lucidum* : glabrum , foliis suboctonis subulatis , aristatis ; caule quadrangulo erecto ; floribus paniculatis .

G. lucidum . *All. Ped.* 1. pag. 5. n. 21. *tab.* 77. f. 2.

Genuæ in collibus *al Lagazzo* , supra *Oregina* , et extra portam *dello Zerbino* . *Peren.*

Caules exactè quadranguli , geniculis tumidis , glabri , ramosi , erecti , vel adscendentes , etiam bipedales . Folia verticillata , subcarnosa , subulata , subtus magis convexa , et pallidiora , utrinque sulco longitudinali dirempta , terminata setulâ albâ , glabra , marginibus planis , deorsum strictu scabriusculis ; inferiora suboctona .

Panicula terminalis , ramis primariis oppositis , altero sæpius brevior . Flores ante maturitatem ex-albo-luteoli , in anthesi albi , odor . Corollarum laciniæ acuminato -- aristatæ . Antheræ luteæ . Semina glabra .

60. **GALLIUM** *rubrum* : pubescens ; foliis suboctonis , lineari -- setaceis ; ramis nutantibus ; pedunculo bracteis sublongiori .

G. rubrum . *Sp. pl.* 156 — *All. Ped.* 1. pag. 5. n. 20.

Nil frequentius Genuæ sub lo Sperone . *Peren.*

Fruticulus adscendens , pedalis , ramosissimus , ramis , ramulisque ad unum idemque latus apice nutantibus . Caulis tetragonus ,

tenuissimè pubescens , seu farinosus . Folia verticillata , inferiora suboctona , ramea subsena , floralia duo , omnia lineari - setacea , lætè viridia , tenuiter pubescentia seu farinosa , supra leviter sulcata , subtus nervo dirempta , nullibi scabra , nec setulâ terminata . Flores occupant ramulos , seu potius paniculas foliosas in tota fere caulis longitudine . Pedunculi uniflori brevissimi , foliisque floralibus , sive bracteis ad summum duplo longiores . Corolla supra atro -- rubens , subtus viridescens , quadrifida , laciniis acutis . Antheræ luteæ . Semina glabra .

Margines foliorum plani siccatione revolvuntur . Corollarum laciniæ levi vel arefactione connivent , clauduntur . Habitus hujusce speciei est gerere folia , ramos , flores plus minus secundos , et ramorum extremitates nutantes . Planta pulcherri-
ma visu .

61. RUBIA *tinctorum* : foliis subsenis . *Sp. pl.* 158. a.

Rubia n. 708. *Hall. hist. stirp. indig. helv.* 1. pag. 313.

Rubia silvestre aspera . *Zann. hist. ed. Monti tab.* 145.

Rubia sylvestris aspera major brevioribus foliis . *Boccon. Herb. Ligust. tom. 2. c. 25.*

Genus allo Zerbino , a Pegli locis sylvestribus . *Peren.*

Caules , flacidi , argutè tetragoni , angulis sæpius aculeato - scabris . Folia verticillata , 4 - 6 , lanceolata , acuminata , vel latiora elliptica , acuta , supra lucida , marginibus , et interdum etiam tota pagina superiori

deorsum strictu scabra , internè pallidiora ,
glabra , excepto nonnunquam nervo . Flo-
res luteoli in paniculis terminalibus .

Folia maximè ludunt in nostra planta nu-
mero , figurâ , scabritie . Pars caulis sæpe
hyeme perennat , et angulis glabris unâ
cum nervo dorsali foliorum glabro reperi-
tur . Hinc enata est *Rubia lucida* nonnul-
lorum auctorum .

62. *PLANTAGO lanceolata* : foliis lanceolatis
utrinque acutis , spicâ ovatâ nudâ , scapo
angulato . *Smith Brit. 1. p. 184. -- Sp.*
pl. 164.

Plantago angustifolia minor . C. B. P. 189 --
Moris. Ox. s. 8. t. 16. f. 12.

Plantago quinquenervia angustifolia capitulo
subrotundo . Bocc. herb. Lig. tom. 4. c. 18.

Genus in montibus inter lo Sperone et il
Diamante . Peren.

Folia lanceolata , integra , 5 - nervia , utrin-
que acuminata ; ad eorum basim lana .
Scapi folio longiores , 4 - 6 pollices lon-
gi . Spica terminalis , ovata , nuda . To-
ta planta leviter pubescens . Sic locis sic-
cissimis orta ludit hæc species , quæ in so-
lo humenti , et humiliori fit longè major
omnibus partibus , folisque laxè denticu-
latis gaudet .

63. *PLANTAGO serpentina* : foliis subulatis ,
carnosis , integerrimis , supra sulcatis ; sca-
po tereti ; radice lignosa .

P. serpentina . All. Ped. I. p. 82. n. 302.
ex spec. a CL. BALBIS communicatis.

Frequens in montibus *di Voltri* supra *l' Ac-*
qua Santa , et in monte *Ramazzo . Peren.*

Radix crassa , lignosa , ex qua oritur cæpes

foliorum et caulium : Folia carnosula , subulata , enervia , dorso convexa , supra sulcata , integerrima , in minoribus speciminibus semper incurva , nunc glaberrima , nunc furfureo-farinacea , ut etiam scapus . Scapi teretes , foliis longiores , terminati spicâ cylindricâ , nudâ . Antheræ luteæ .

64. *PLANTAGO coronopus* : foliis linearibus pinnato-dentatis , scapo tereti . *Smith Brit. I. p. 185. --- Sp. pl. 166. --- Savi Pis. I. p. 183.*

Herba stella sive cornū cervinum . *Dod. Pempt. 109.*

Plantago ceratophyllos sive *coronopus hirsutus hortensis* . *Moris . Ox. s. 8. t. 17. f. 31.*

Genuæ ubique extra portam *Pila* , et in mœniis orientalibus . *Ann.*

65. *PLANTAGO psyllium* : caule herbaceo ; foliis linearibus integris dentatisve , capitulis aphyllis .

P. psyllium . Sp. pl. 167 --- Savi Pis. I. p. 183. --- Bull. Herb. de la France tab. 363.

In herbidis *all' Acquasola . Ann.*

Caulis erectus , simplex vel ramosus . Folia patentia , linearia , opposita , et basi connata , carnosula , supra subcanaliculata , subtus nervo dirempta , nunc integerrima , nunc laxè denticulata , supremâ confertissima , ut pro ternis vel quaternis imponent . Capitula aphylla in axillis supremis . Pedunculi inæquales , inferiores folio longiores ; terminales ut plurimum brevissimi . Tota planta pubescens .

66. *CORNUS sanguinea* : ramis rectis , foliis ovatis utrinque viridibus , cymis nudis planis . *Smith Brit. I. p. 183. --- Sp. pl. 171. --- Savi Pis. I. p. 185.*

Virga sanguinea . *Dod. Pempt.* 782.

Genuæ in montibus sub *lo Sperone* , et sub
i due Fratelli Feritorem versus . *Peren.*

TETRANDRIA TETRAGYNIA .

67. *SAGINA apetala* : caule erectiusculo , dichotomo , subpubescente ; floribus apetalis . *Lam. ill. n.* 1747 -- *Linn. Mant.* 2. 559 -- *Smith Brit. I. p.* 199.

Genuæ ubique in mœniis maritimis . *Ann.*

Caulis erectus vel etiam diffusus , nunc glaber , nunc pilis adpersus , simplex vel ramosus . Folia opposita , basi connata , lineari-subulata , sæpe infernè ciliata . Flores alterni , axillares , duo tres in ejusdem cauliculi vel ramuli summitate , pedunculo nudo suffulti . Foliola calycina concavo-lanceolata , acuta , fœcundationis , et fructificationis tempore conniventi-erecta , hisce peractis , capsulâque dehiscente , crucis in modum patentia . Petala apud nos omnino nulla . Stamina calyce breviora , tenuissima , e receptaculo orta . Capsula oblonga , apice dehiscens , vix calyce longior . Planta pusilla ; modò tota glabra .

PENTANDRIA MONOGYNIA .

68. *HELIOTROPIUM europaeum* ; foliis ovatis integerrimis tomentosis , rugosis , spicis conjugatis . *Sp. pl.* 187. -- *Savi Pis. I. p.* 197. --- *Desfont. Atl. I. p.* 152. --- *Lam. ill. tab.* 91. *fig. I.* --- *Jacq. Austr.* 3. t. 207.

Heliotropium . *Dod. Pempt.* 70.

Ubique in fluminum alveis . *Ann.*

69. *CYNOGLOSSUM omphalodes* : repens , foliis radicalibus cordatis . *Sp. pl.* 193. ---
Scop. Carn. ed 2. tom. I. p. 123. tab. 3. --- *Bulliard Herb. de la France tab. 309.*
 Boraginis altera species . *Dod. Pempt. 627.*
 Borago minima herbariorum . *Moris . Ox . s. 11. t. 26. f. 3.*
 In Appenninis della Bocchetta . Florebat Aprilis exeunte . *Peren.*
70. *PRIMULA elatior* : foliis dentatis rugosis medio contractis , scapo multifloro , corollæ limbo plano . *Smith Brith. I. p. 223.*
Primula veris β. Sp. pl. 204.
Primula veris altera Matthioli . Lugd. hist. I. p. 834.
 Ad radices montis Ramazzo . *Perenn.*
 Flores inodori , lutei , maculis quinque croceis in fauce . Faux inflata . Tota planta villosa . Folia mollissima , holosericea .
71. *ANAGALLIS arvensis* : foliis ovatis subtus punctatis , caule procumbente . *Smith Brit. I. p. 230. α. --- Sp. pl. 211 --- Savi Pis. I. 220.*
A. phœnicea. Lam. Fl. Franc. 2. n. 331. III -- Illustr. n. 1983. tab. 101.
Anagallis phœniceo flore. Hort. Rom. 2. t. 45. γ. Smith l. c.
Anagallis cœrulea . Lam. Fl. Franc. 2. n. 331. II.
Anagallis cœruleo flore. Hort. Rom. 2. t. 46.
 Utraque varietas Genuæ occurrit in littore alla Foce . *Ann.*
72. *PLUMBAGO europaea* : foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris . *Sp. pl. 215 -- Desf. Atl. I. p. 171.*

Plumbago quorundam. *Clus. hist. lib. V. p.*
 cxxiii --- *Hort. Rom. 2. tab. 39.*

In littore *alla Foce*, et a *Sestri di Ponente*.
Peren.

73. CONVULVULUS *cantabrica*: foliis lineari-
 ribus, acutis, caule ramoso subdichotomo,
 calycibus pilosis. *Sp. pl. 225* --- *Savi Pis.*
I. p. 225 --- *Desf. Atl. I. p. 174* --- *Jacq.*
Austr. 3. t. 296.

Convolvulus *linariæ folio*. *Moris. Ox. s. I.*
t. 4. f. 3.

Genuæ in collibus *al Lagazzo*. *Perenn.*

74. CAMPANULA *glomerata*: caule angulato
 simplici; capitulo terminali, floribus sessili-
 bus; foliis oblongis, radicalibus petiolatis
 cordatis.

C. glomerata. Sp. pl. 235. Smith Brit. I. p.
238 --- *Allio. Ped. I. p. 111. n. 411. tab. 39.*
fig. I. luxurians.

Genuæ sub *lo Sperone* *Porciferam* versus.
Perenn.

Caulis simplex, erectus, angulosus. Folia
 ovato-oblonga, acuminata, crenata, alter-
 na, radicalia longè petiolata, cordata. Pe-
 tiolus sensim sensimque evanescit in suc-
 cessivis foliis, ita ut superiora sint prorsus
 sessilia, amplexicaulia. Flores sessiles, parvi,
 in capitulo terminali compacto. Planta le-
 viter pubescens, scabriuscula.

Insignem hujus speciei varietatem collegi in
 summitate altioris montis *de' due Fratelli*,
 cujus caulis erat plusquam bipedalis, folia
 crebriora et latiora quàm in antecedente,
 flores in capitulis densissimis, terminali
 majore, composito, lateralibus solitariis, al-
 ternis, axillaribus, sessilibus, numerosis.

Icon Allioni non ad *Campanulam petraeam*, ut suspicatur Willdenowius in *Sp. pl.*, sed ad *glomeratam* pertinet sine ulla dubitationis nota.

75. *VIOLA odorata*: foliis cordatis; stolonibus reptantibus; foliolis calycinis oblongo-ellipticis, utrinque obtusis.

V. odorata. Sp. pl. 1324. a -- Smith Brit. I. p. 245. a -- Savi Pis. 2. p. 295 -- Bull. Herb. de la France tab. 169.

Ubique in aggeribus. *Perenn.*

In planta aprico et sicco solo orta folia una cum petiolis sunt hirsuta, e contra fiunt glabriuscula in hortis, humidisque locis. Cæspes foliorum et pedunculorum in stolonum extremitate, folia pubescentia etiam in pagina inferiori, stipula utrinque una ad basim pedunculorum secreta, et distincta, flores odori, foliola calycina oblongo-elliptica, utrinque obtusa citò distinguunt hanc speciem a *Viola canina*.

76. *VIOLA canina*: caule adscendente; foliis cordatis, subtus glabris; foliolis calycinis lanceolato-linearibus, supernè acuminatis.

V. canina. Sp. pl. 1324 -- Smith Brit. I. p. 246 -- Scop. Carn. ed. 2. tom. 2. p. 182 -- Savi Pis. 2. p. 295.

Viola canina cœrulea inodora sylvestris serotina. Lob. ic. 609.

Viola martia minor flore violaceo. Barrel. ic. 695.

In monte *Ramazzo*, et in collibus *al Boschetto in Polcevera. Perenn.*

Caules adscendentes, inter folium et folium alternè semicylindrici. Folia cordato-ovata, dentata, subtus semper glabra, pallida,

supra pilis interdum adspersa ; caulina alterna. Petioli sulcati , radicales e sinu stipulae laciniatae , bifidae , segmento utrinque uno , lineari , acuminato . Stipulae petiolorum caulinarum sunt profundius bipartitae. Pedunculi solitarii , axillares , folio longiores , uniflori , glabri , angulosi , apice incurvi , bracteis duabus linearibus prope medium instructi. Flores pallide purpurei , fauce albidis et venosi : petalis duobus ibidem pubescentibus. Foliola calycina lanceolato--linearia , inferne latiora , obtusa , truncata , supernè acuminata. Calcar nunc rectum , nunc apice incurvum. In calidioribus locis floribus amplioribus , et pallidioribus gaudet .

77. VERBASCUM *sinuatum* : foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis caulinis amplexicanlibus nudiusculis , rameis primis oppositis. *Sp. pl.* 254 --- *Savi Pis. Lp.* 240. --- *Desf. Atl. I. p.* 186.

Verbascum laciniatum Matthioli. *Lugd. hist.* 2. p. 1302.

Genuæ ubique in viis. *Bien.*

78. HYOSCYAMUS *albus* : foliis petiolatis , sinuatis , obtusis ; floribus subsessilibus . *Sp. pl.* 257 --- *Savi Pis. I. p.* 244 --- *Desf. Atl. I. p.* 188 --- *Lam. ill. tab.* 117. f. 2. --- *Bull. Herb. de la Franc. tab.* 99.

Hyosciamus albus vulgaris. *Clus. hist. lib. V. p.* LXXXIII.

Genuæ in mœniis maritimis , et in littore alla Foce. *Ann.*

Passim hæc planta ludit foliis inferioribus majoribus , superioribus parvis , precipuè ubi nascatur in muris , et locis sterilibus.

79. SAMOLUS *valerandi* : foliis obtusis , racemo multifloro, pedicellis bracteolatis. *Smith Brit. I. p. 259 --- Sp. pl. 243 --- Savi. Pis. I. p. 233.*

Anagallis aquatica altera Lobelii. *Lugd. hist. I. p. 1090 --- Hort. Rom. 2. tab. 47.*

A Sestri di Ponente in littoris initio , locis humidis. *Bien.*

80. HEDERA *helix* : foliis ovatis lobatisque. *Sp. pl. 292. α --- Smith Brit. I. p. 267 --- Savi Pis. I. p. 254 --- Lam. ill. tab. 145. f. 6. --- Bull. Herb. de la France tab. 133.*

Hedera. Dod. Pempt. 413.

Ubique in muris campestribus. *Peren.*

81. THESIUM *linophyllum* : paniculâ foliatâ , bracteis ternis; foliis linearibus ; tubo calycino brevissimo .

T. linophyllum. Sp. pl. 301. α --- Smith Brit. I. p. 269 --- Lam. ill. tab. 142. f. 1.

Anonymos lini folio. *Clus. hist. lib. 3. p. 324.*

Genuæ in collibus *al Lagazzo. Peren.*

Radix lignosa. Caules cæspitosi , angulati , erecti , vel adscendentes , pedales et ultra. Folia linearia , secunda , licet sparsa , alterna , plusquam pollicem longa , subtus convexa, supra plana . Flores in panicula terminali , foliata , secunda , ramis patentibus. Pedicelli uniflori , quatuor circiter lineas longi , paullo infra apicem gerunt tres bracteas , lineari -- subulatas , media lateralibus duplo longiore, supra quas pedicellus crassescit. Flores odori , quinquefidi, supra albi , subtus instructi nervis viridibus, usque ad apicem laciniarum productis;

laciniæ dente utrinque uno prope basim instructæ. Anthæræ luteolæ

PENTANDRIA DIGYNIA

82. *ASCLEPIAS vincetoxicum*: foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Sp. pl.* 314 --- *Bull. Herb. de la France.* tab. 51.

Vincetoxicum. *Dod. Pempt.* 407.

Inter *Voltri*, et *l'Acqua Santa*. *Peren.*

83. *CHENOPODIUM rubrum*: foliis rhomboideo--triangularibus sinuato--dentatis; racemis erectis compositis, foliolosis. *Smith Brit. I. p.* 274. & --- *Sp. pl.* 318.

Pes anserinus. *Lugd. hist. I. p.* 542.

In littore *al Deserto* prope *Sestri di Ponente*, *Genuæ* in mœniis *alla Darsena*. *Ann.*

Folia basi longè cuneata, integra, reliquo margine sinuato-denticulata.

84. *CHENOPODIUM polyspermum*: foliis ovatis integerrimis, caule prostrato, racemis cymosis divaricatis aphyllis. *Smith Brit. I. p.* 278 --- *Sp. pl.* 321 --- *Savi Pis. I. p.* 270.

Polyspermon Cassiani Bassi Anguillaræ. *Lob. ic.* 256.

Blitum polyspermum a seminis copia. *Moris. Ox. s. 5. t. 30. f. 6.*

Genuæ ubique in viis. *Ann.*

85. *SALSOLA tragus*: herbacea, glaberrima; foliis crassis, subulatis, apice spinosis.

S. tragus. *Sp. pl.* 322.

Crithmum spinosum. *Bocc. herb. Lig. tom. 4. c. 63.*

Tragon Matthioli. *Lob. Ic.* 797. planta junior.

Tragus Matth. *Lugd. hist.* 2. p. 1477. planta senescens foliis junioribus orbata.

Nil frequentius in omnibus littoribus Liguriæ.
Ann.

Distinguitur a *S. Kali*, quia est tota glaberrima, et foliis crassis gaudet; dum illa tota hirsuta ac scabra est, habetque folia longiora, et tenuiora. Cæterum in *S. trago* caules nunc eriguntur, sæpius verò decumbunt, et latos efformant cæspites. Maxima confusio apud auctores circa hæc species; plurimi enim habuerunt pro *S. Kali* juniorem *S. tragus*, et vicissim.

UMBELLATÆ.

86. **ERYNGIUM** *maritimum*: foliis radicalibus subrotundis plicatis, spinosis, capitulis pedunculatis. *Sp. pl.* 337 --- *Smith Brit.* I. p. 288 --- *Savi Pis.* 1. p. 277 --- *Desf. Atl.* I. p. 224. --- *Hort. Rom.* 6. tab. 17.
Eryngium *marinum*. *Clus. hist. lib. V. pag. CLIX.*

Ubique in littore a *Sestri di Ponente, Pegli, Voltri. Peren.*

87. **ECHINOPHORA** *spinosa*: foliolis subulato-spinosis trifidis integrisve integerrimis. *Smith Brit.* I. p. 293 --- *Sp. pl.* 344 --- *Desf. Atl.* I. p. 234 --- *Savi Pis.* I. p. 285 --- *Lam. ill. tab.* 190. f. I --- *Cavanil. Ic. et Descr.* 2. p. 26. n. 142. t. 130.

In littore a *Pegli. Peren.*

88. **DAUCUS** *carota*: fructibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Sp. pl.* 348. α --- *Smith Brit.* I. α

Daucus polygamus. Jacq. Hort. Vind. tom. 3. tab. 78.

Pastinaca sylvestris genuina Dioscordis. Morris. Ox. s. 9. t. 13. f. 2.

Genuæ ubique in collibus cultis. *Bien.*

89. **DAUCUS** *gummifer*: hirsutus; foliis subcarnosis, supra lucidis; involucri laciniis lanceolatis, plano -- patentibus; flore centrali sterili nullo.

D. gummifer. Vitm. Sum. Plant. 2. p. 136.

D. hispanicus. All. Ped. 2. p. 31. n. 1382.

Pastinaca tenuifolia, lucida, gummi manans. Bocc. Mus. tab. 20.

Genuæ in scopulis, et mœniis propè *la Cava. Bien.*

Radix fusiformis. Folia ampla, ambitu triangularia, convexo--patentia, bi--tri--pinnata, foliolis ovato--oblongis, pinnatifido--dentatis, dentibus obtusiusculis, et in parvum mucronem terminatis, subcarnosa, supra intensè lucentia, et veluti vernice illinita, nunc glaberrima, nunc subpilosa, subtus villosa, et pallidiora. Petioli hirsuti, striati, supra canaliculati, basi parum dilatati, amplexicaules. Caulis erectus, teres, crassus, striatus, flexuosus, etiam bicubitalis, ramosissimus, dichotomus, geniculis tumidiusculis, hirsutus, scaber, villis albis declinatis, sæpe rubens. Umbella ampla, terminalis, confertissima, flore sterili centrali destituta. Involucrum universale numerosum, foliaceum, subbipinnatifidum, laciniis lanceolatis, decurrentibus, plano--patentibus, petiolo membranâ albo--scariosâ subciliatâ marginato. Involucella pariter numerosa, foliolis 3--5--fidis, vel simpli-

cibus lanceolatis acuminatis, margine albo-scariosis, subciliatis. Radii umbellæ crassi et hirsuti. Flores albi. Semina ut in *D. carota*, sed majora. Planta vulnerata fundit humorem primò tenuem, sed aeris attractu citò glutinosum, aroma gratè olentem, unde odor plantæ. Caulis in plantis humilioribus est hirsutissimus, in elatioribus supernè hirsutie brevissima gaudet, estque magis scaber.

90. *SELINUM austriacum*: caule sulcato; involucro universali polyphylo; foliolis cuneiformibus incis. *Willd. Sp. pl.* 1397. *Jacq. Austr. I. tab.* 71.

Selinum argenteum. *Crantz Stirp. Austr. fasc.* 3. *p.* 174. *n.* 10. *tab.* 4. *f.* 2.

Genus in collibus allo Zerbino, Porta delle Chiappe. *Perenn.*

91. *ATHAMANTA cervaria*; foliis inferioribus bipinnatis, foliolis ovato-oblongis, dentato-spinulosis, coriaceis; fructibus compressis, nudis.

A. cervaria. *Sp. pl.* 352 --- *Jacq. Austr. I. tab.* 69.

Selinum cervaria. *Savi Pis. I. p.* 297.

Oreoselinum apii folio majus. *Garid. Aix. p.* 343. *tab.* 116.

Daucus secundus selinoides. *Lob. ic.* 720.

Genus in collibus inter antiqua et nova mœnia, et in montibus dello Sperone et Diamante. *Perenn.*

Folia inferiora bipinnata, foliolo impari cordato-vel-cuneato-trilobo, lateralibus oblique cordatis, subincisis; cæterum cuncta foliola sunt ovato-oblonga, coriacea, supra viridia, subtus glauca, basi integra,

reliquo margine argutè dentata, dentibus apice spinulosis. Folia superiora minora, pinnata. Pro supremis foliis vagina tantum. Petioli striati, supra canaliculati, basi in vaginam striatam dilatati. Caulis teres, striatus, interdum adeo fortiter ut angulosus sit dicendus, erectus, sesquipedem, duos pedes altus, dichotomus. Umbellæ solitariae, terminales, convexæ. Flosculi 20-30 in quavis umbellula. Involucra, et involucella ex pluribus foliolis lineari-subulatis. Petala alba, vel rubentia, ovato-acuta, apice inflexo. Receptaculum fungosum. Germen compressum, ellipticum, dorso leniter convexum, et striatum, viride, vel rubidum, in duo semina dehiscens, quæ, ubi separentur, margine videntur alata. Styli duo persistentes, reflexi. Tota planta glabra.

92. PEUCEDANUM officinale *β. Sp. pl.* 353.

Peucedanum majus Italicum. *Lob. ic.* 782. —

Hort. Rom. 5. tab. 96.

Hippomarathrum longioribus foliis. *Bocc.*

herb. Lig. tom. 4. c. 35.

Genuæ in collibus supra Oreggina, et al Lagazzo. *Perenn.*

Folia constituunt cæspitem radicalem, unâ cum petiolis plusquam cubitalia, triquintuplicato-ternata, foliolis coriaceis, linearibus, canaliculatis, prælongis, integerrimis, dorso nervosis, margine incrassatis. Petioli teretres, stricti, striati, basi paullulum dilatati in vaginam. Caulis teres, striatus, erectus, dichotomus, bipedalis, vaginis tantum pro foliis ad divisiones præditus. Umbella ampla, patens, concava, radiis

12-20 . Involucrum universale ex tribus quatuorve foliolis , inæqualibus , deciduis , integris , duas tres lineas longis . Involucella numerosa , lineari-subulata , inæqualia , umbellulâ breviora . Flores omnes fertiles . Petala luteola , ovata , inflexa , terminata squamulâ lacerâ , quæ petalorum inflexione cælatur . Receptaculum fungosum , lutescens . Germen oblongum , cylindraceum , glabrum , apice veluti truncatum , in duo semina dehiscens , divisionis loco striâ elevatiori notatum , cæterum vix sensibiliter striatum . Styli duo reflexi persistentes . Planta glabra .

93. CRITHMUM *maritimum* : foliolis lanceolatis , carnosis . *Sp. pl.* 354. --- *Smith Brit. I. p.* 306. --- *Desf. Atl. I. p.* 248. --- *Lam. Ill. tab.* 197. --- *Jacq. Hort. Vind. tom. 2. p.* 88. *tab.* 187.

Ubique locis maritimis totius Liguriæ super scopulos . *Perenn.*

Caulis basi lignosus , adscendens , teres , striatus , vel simplex , vel bifidus , vel dichotomus , subpedalis , infernè foliosus , supernè fere nudus . Folia ima bipinnata , superiora tantum pinnata , pinnarum foliolis ternatis , lanceolatis , acuminatis , carnosis , integerrimis . Petioli basi vaginantes . Umbella fastigiata . Involucra et involucella foliolis ovato-lanceolatis composita . Petala ex-albo-viridia , ovata , apice inflexo . Fructus ovati , angulosi , nullimodè compressi . Receptaculum fungosum . Tota planta glabra .

94. FERULA *sulcata* : foliolis linearibus ; umbella primordiali sessili , lateralibus bre-

vioire ; seminibus longè ellipticis profunde sulcatis. *Des. Atl. I. pag. 252. tab. 67.*
Ferula nodiflora . Jacq. Austr. 5. App. tab. 5.

F. nodiflora. Sp. pl. 356. ?

Libanotis tenuifolia altera ferulæ folio , et semine italica . Barrel. ic. 835.

Libanotis ferulæ folio et semine italica . Bocc. Mus. tab. 123.

Ubique in montibus Genuensibus supra Oregina usque al Diamante . Perenn.

95. *SIUM nodiflorum* : foliis pinnatis , foliolis ovatis , æqualiter serratis , umbellis sessilibus oppositifoliis , caule procumbente .
Smith. Brit. I. p. 313. --- Sp. pl. 361. --- Savi Pis. I. p. 302.

Sium aquaticum repens et procumbens ad alas floridum seu umbellis candidis ad genicula dispositis . Moris . Ox. s. 9. t. 5. f. 3.

Genuæ in palustribus sub Albaro . Perenn.

96. *SCANDIX australis* : seminibus subulatis hispidis , floribus radiatis , caulibus levibus . *Sp. pl. 369. --- Desf. Atl. I. p. 259.*

Scandix semine rostrato italica . C. B. Prodr. pag. 78. cum bona icone .

Genuæ locis herbidis sub il Castellaccio. Ann.

PENTANDRIA PENTAGYNIA

97. *LINUM viscosum* : supernè piloso-viscosum ; foliis inferioribus ellipticis , tri-quinquenervibus .

L. viscosum . Sp. pl. 398.

Linum sylvestre latifolium vinoso amplo flore italicum. Barrel. ic. 1013.

Genuæ copiosè circum *lo Sperone. Perenn.*

Caulis teres, erectus, usque ad duos pedes altus, villosus, simplex, summitate racemosus. Folia sessilia, integerrima, villosa, sparsa, stricta, inferiora crebriora, elliptica, latiora, obtusa, superiora successivè angustiora et acutiora, ita ut summa lanceolato-acuminata audiant; in specimenibus vegetioribus vel omnia vel ima 5-nervia, reliquis trinerviis, in macrioribus verò cuncta trinervia. Racemi terminales, dichotomi, patuli. Flores solitarii, secundi, distichi, alternantes inter se, et cum foliis floralibus, ideo nullimodè axillares, ampli, calyce plusquam duplo longiores, rubidi, et fæcum vini colore, ita ut primo intuitu pro floribus malvaceis quis acciperet. Calyx quinquephyllus, foliolis lanceolatis, acuminatis, inæqualibus, duobus exterioribus paullulum majoribus. Germen globosum, striatum, apicem versus pubescens, cæterum glaberrimum. Stigmata quinque. Capsula decemlocularis. Superior plantæ pars est viscosa, ibique pili sunt apice glandulosi, et glutiniferi; in foliis et calyce hi pili glandulosi marginem inferioris paginæ occupant. In plantis vegetioribus viscositas sensibilior. Descripsi in loco natali, ubi magna vegetationis luxuries, aer purissimus saluberrimus, unde maria, montes, Porciferæ, et Feritoris valles, flumina, pomaria, ipsaque urbs Genua ictu oculi latè patent.

Linum sylvestre Scop. Carn. I. p. 229. tab. 11.

hoc nostrum videretur, ut jam innuit *Jacquinus* in *Fl. Aus. tom. I. p. 21.*, et *Vitmannus* in *Summa Plant. tom. 2. p. 213.*, sed mea planta non habet folia ullo pacto serrulata, nec pedunculos gerit axillares, ut vult *Scopolius*. *Linum hirsutum* verò ipsius *Jacquinii* l. c. tab. 31. præcipuè differt ab hoc pilis simplicissimis, nec glanduliferis.

98. *LINUM gallicum*: calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis alternis, paniculæ pedunculis bifloris. *Sp. pl. 401* --- *Gerard Galloprov. p. 421. n. 9. t. 16. f. 1.*

In montibus supra l' *Aqua Santa a Voltri.*
Ann.

Caulis teres, striatus, erectus vel adscendens, usque ad duos pedes altus, infernè ramosus, apice in laxam paniculam solutus. Folia lanceolato-linearia, acuminata, sessilia, alterna, sparsa. Panicula foliosa, pedunculis uni-vel-bifloris. Flores parvi, lutei, senio albi. Foliola calycina lanceolata, acuminata, basim versus ciliata. Pistilli quinque. Planta glabra.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

99. *GALANTHUS nivalis*. *Sp. pl. 413* --- *Smith Brit. I. p. 352* --- *Lam. ill. tab. 23c* --- *Jacq. Austr. 4. tab. 313.*

Leucojon bulbosum triphyllon. *Dod. Pempt. 230.*

Leucojum bulbosum præcox minus. *Clus. hist. lib. 2. p. 169.*

Ex Apenninis della *Bocchetta.* D. *VIVIANI.*
Peren.

100. *ALLIUM sphaerocephalon*: caule teretifolio

umbellifero , foliis semiteretibus , staminibus tricuspidatis, corollâ longioribus. *Sp. pl.* 426 — *Savi Pis.* I. p. 343 — *Desf. Atl.* I. p. 291.

Allium s. *Moly montanum* V. *Clus. hist. lib.* 2. p. 195.

Genuæ copiosè sub *lo Sperone. Perenn.*

Radix bulbus tunicatus ; interdum a vaginis subterraneam scapi partem tegentibus involvuntur quoque nonnulli bulbilli triquetri, acuminati, nunc brevi, nunc longissimo tenuissimoque pedunculo e bulbo radicali orto suffulti. Folia semiteretia , fistulosa , supra canaliculata , infernè vaginantia , citò are-scentia. Scapus teres , unum duos pedes altus, per tres quatuorve pollices foliorum vaginis infernè vestitus , inde nudus. Capitulum terminale , multiflorum , compactum. Spatha monophylla , brevis , capitulum non excedens , albo-scariosa , in plures lacinias acutas scissilis . Pedunculi virides , apice crassiusculi, exteriores breviores , quod ad capitulum efformandum magis conducit. Corolla strictissima, triquetropiramidalis , atro-purpurea. Stamina alterne trifida , exerta , unà cum stigmate colore petalorum. Planta glabra, leviter olens
Allium sativum L.

101. *ALLIUM paniculatum* : caule subteretifolio umbellifero, pedunculis capillaribus effusis , staminibus simplicibus , spathâ longissimâ. *Sp. pl.* 428 --- *Savi Pis.* I. p. 344. ex spec. ab Auct. missis.

A Voltri piope *l' Acqua--Santa* , et ad fontem aquæ calcis sulphuratæ loco dicto *la Pena. Perenn.*

Pedunculi longi , effusi , intensè violacei ut corolla ; ad eorum basim bracteolæ albidæ vel--violaceo--scariosæ , rarò bulbilli virentes. Corolla infundibulum trigonum refert. Petala ovata , concava , dorso carinata , obtusa et fere truncata ad apicem. Stamina simplicia , inæqualia , violacea , alia exerta , alia corollæ æqualia vel etiam minora. Spatha diphylla , inæqualis , umbellâ longior.

102. ALLIUM *triquetrum* : scapo nudo , foliisque triquetris , staminibus simplicibus .

A. triquetrum. Sp. pl. 431--Savi Pis. I. p. 346 -- Desf. Atl. I. p. 287.

In collibus Porciferæ. *Perenn.*

Caulis brevis , crassus , adeo argutè triqueter , ut fere alatus dici possit .

103. ALLIUM *album* : umbellâ capsuliferâ ; staminibus simplicibus ; scapo nudo triquetro ; foliis radicalibus , lanceolatis , carinatis , amplexicaulibus . *Santi Viag. al Montam. p. 352. tav. 7 -- Savi Pis. I. p. 346.*

Genuæ in hortis , locisque herbidis frequens. *Perenn.*

Caule tenuiori , altiori , vix acutè anguloso præcipuè distinguitur ab *A. triquetro* L.

104. ALLIUM *carneum* : foliis planis , scapo tereti ; staminibus simplicibus , corollâ brevioribus , spathâ quadrifidâ. *Soc. Med. d'Emul. di Gen. tom. 2. prim. quadr. p. 127. -- Targ. Tozz. Ist. Bot. ed 2. tom. 1. tav. VI. fig. 304. tom. 2. p. 242. n. 358.*

Moly persici flore. *Bocc. Herb. Lig. tom. 2. c. 107.*

Moly serpentinum vocatum. *Lob. ic. p. 160-- C. B. Phyt. 108.*

Moly serpentinum. *Lugd. Hist.* 2. p. 1593.

Moly angustifolium foliis reflexis. *C. B. P.*

76 -- *Moris. Ox. s. 4. t. 16. f. 11.*

Ubique in collibus Genuensibus. *Peren.*

Radix bulbus ovatus, bulbillis pedicellatis, erectis, acuminatis, inter exteriores tunicas dispositis basi auctus. Integumentum compactum, fuscum, ubi aridum fragile cuncta obtegit. Folia plana, canaliculata, linearia, acuminata, apicibus involutis, minutissimè ciliata, tres quatuor lineas infernè lata, exhinc successivè decrescentia, supra pallida et glauca, subtus lætè viridia, imum scapum per breve spatium vaginantia. Scapus teres, nudus, ante florum anthesin apice nutans, dein erectus, bipedalis, et ultra. Flores in umbella terminali unà cum bulbillis sessilibus ad pedunculorum basim. Spatha pedunculis evolutis brevior, adhuc clausa albo--virens, dein albo--scariosa, monophylla, infundibuliformis, quadrifida, laciniis acuminato--subulatis. Petala conniventi--erecta, ovato--oblonga, obtusa, apice crenulata, candido--rosea, basi macula viridi. Stamina corollæ breviora, alternè inæqualia. Filamenta simplicia, infernè dilatata, et connata cum unguibus petalorum. Antheræ luteæ. Germen trigonum, viride; stylus albus; stigma simplex.

Tota planta glaberrima, et *Allium sativum* L. redolens. Sæpe dum corollæ exteriores sunt expansæ, et candido--roseæ, interiores sunt inapertæ, minores, albæ.

105. *ERYTHRONIUM dens canis* Æ. *Sp. pl.* 437.

--*Lam. ill. tab. 244. f. 1.*

Dens caninus albo flore. *Clus. hist. lib. 2. p.*
266.

In monte *Fasce*, et ad radices montis *Gneo*.
Peren.

Flos albidus, aut pallidissimè purpurascens.
Folia lanceolata, vel ovato--lanceolata, an-
gusta, maculata.

106. ORNITHOGALUM *narbonense*: racemo
oblongo, filamentis lanceolatis membrana-
ceis, pedunculis floribusque patentibus. *Sp.*
pl. 440.

O. narbonense. Dod. Pempt. 222.

Genuæ in collibus *al Lagazzo. Peren.*

Petala supra alba, subtus dorso viridia, mar-
ginibus albis. Stamina alba, infernè dila-
tata, supernè subulata. Antheræ incumben-
tes luteæ; cæterum et in hac specie pe-
dunculi floriferi patent, fructiferi sunt sca-
po approximati.

107. ORNITHOGALUM *umbellatum*: floribus
corymbosis, pedunculis scapum superanti-
bus, filamentis subulato-dilatatis integerri-
mis. *Smith Brit. I. p. 364--Sp. pl. 441--Desf.*
Atl. I. p. 296--Jacq. Austr. 4. tab. 343.

Scilla campestris. Savi Pis. I. p. 350.

Ubiquæ in hortis Genuensibus. *Perenn.*

108. SCILLA *italica*: racemo oblongo; bracteis
binatis, subulatis; petalis patentibus.

S. italica, Vitm. Sum. pl. 2. p. 309.

S. italica. Sp. pl. 442?

In collibus Genuensibus. *D. GRIOLET. Flo-*
ret vere. Peren.

Bulbus solidus, parvus. Folia numerosa li-
nearia canaliculata, obtusiuscula, basi at-
tenuata. Scapus subpedalis. Racemus ob-
longus, florifer patens, fructifer strictus,

Bracteæ duæ ad basim cujusvis pedunculi, subulatæ, angustissimæ, inæquales, longior pedunculum æquans. Flores duodecim circiter, inferiores primores. Petala cœrulea, patentia. Filamenta teretia, antheris cœruleis. Nostra planta, quoad florum numerum, non refert certè iconem Clusianam tributam *Scillae italicae* Linn.; magis appropinquaret *Scillam vernam* Smith Brit. I. p. 364., sed flores circiter 12., nec 3--6, bracteæ subulatæ angustissimæ, nec lanceolatæ obtusæ meam speciem ab illa satis videntur distinguere.

109. *SCILLA autumnalis*: foliis linearibus, floribus corymboso -- racemosis, pedunculis ebracteatis, adscendentibus, longitudine florum. Smith Brit. I. p. 366 --- Sp. pl. 443 --- Savi. Pis. I p. 352 --- Cavanil. Icon. et Descr. 3. pag. 38. n. 300. tab. 274. f. 2.

Latè operit montes supra *Oreggina* usque ad *Diamante*. Peren.

110. *ANTHERICUM liliago*: foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinato. Sp. pl. 445 --- Pollich Palat. I. p. 334. n. 335 --- Desf. Atl. I. p. 304 --- Jacq. Hort. Vind. tom. I. p. 36. tab. 83.

Genuæ in collibus ad *Lagazzo*. Peren.

Folia linearia, acuminata, canaliculata, stricta, apicibus recurvis, glabra, striata, scapo breviora, ejusque basim vaginantia. Scapus simplex, erectus, sesquipedalis, nudus, teres, substriatus, et, quâ florifer est, angulosus. Racemus terminalis, latus, simplex, ante florum anthesin nutans, 4 -- 6 pollices longus. Flores alterni, inferiores primores, magis dissiti, et longius peduncu-

lati . Pedunculi prope basim articulati. Bractea linearis , pedunculo subæqualis , ejus basim amplexans , ex-viridi vel albo-lutescens. Corolla fecundationis tempore patentissima , ante et post nuptias clausa , cylindræa. Petala sex , alba, oris diaphano--punctatis , venisque longitudinalibus diaphanis striata, tria exteriora angustiora , ad apicem præ reliquis viridia. Stamina fecundationis tempore erecta , filamenta alba, glabra , simplicia , nullimodè dilatata, aut pubescentia, tria longiora. Antheræ luteæ, lineares , longitudinaliter dehiscentes. Germen trigonum , glabrum , viride. Stylus staminibus longior , albus , sæpius declinatus. Stigma simplex , obtusum , ad lentem pubescens.

111. ASPARAGUS *acutifolius* : caule inermi fruticoso , foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis æqualibus. *Sp. pl.* 449 --- *Desf. Atl. I. p.* 306 --- *Hort. Rom.* 5. *tab.* 53.

Corruda prior. *Clus. hist. lib. v. p.* CLXXVIIJ.
Genuæ in collibus ad portam *delle Chiappe*.
Peren.

112. HYACINTHUS *comosus* : corollis angulato--cylindricis : summis sterilibus longius pedicellatis. *Sp. pl.* 455 --- *Savi Pis. I. p.* 354 --- *Jacq. Austr. 2. tab.* 126 --- *Hort. Rom.* 6. *t.* 49.

In collibus circa Genuam passim ; copiosè in pascuis montanis *della Bochetta*. *Peren.*

113. HYACINTHUS *racemosus* : floribus densè racemosis , corollis ovato--oblongis , deorsum imbricatis; foliis perangustis, laxis, scape longioribus .

H. racemosus. Sp. pl. 455 --- Krockher Siles. I. p. 538. --- Jacq. Fl. Austr. tom. 2. tab. 187.

H. juncifolius, Enc --- Fl. Franc. 3. n. 860. iv --- Soc. Med. d' Emul. di Gen. tom. I. sec. quad. p. 81.

Hyacinthus vernus Botryoides minor, cœruleus, angustioribus foliis, odoratus. J. Bauh. hist. 2. lib. 19. p. 571.

Genuæ locis herbidis collinis. Peren.

Scapi 1 — 3 simul ex eodem bulbo, sex septem pollices longi. Folia vix lineam lata, canaliculata, striata, super terram strata, scapo longiora. Flores argutè odori, in racemo terminali admodum denso, brevi, globoso, vel conico. Corollæ ovato-oblongæ, atro-cœruleæ, pendulæ et deorsum imbricatæ, dentibus marginalibus sex, primùm albidis, dein cœruleis. Cum flores inferiores sint primores, ideo corollæ successivæ adhuc clausæ, et imperfectæ minores sunt, sed maturæ reliquas æquant. Flores terminales minores, steriles, dilutiùs cœrulei. Pedunculi colore florum. Bracteæ minimæ, albidæ ad eorum basim.

114. *FRANKENIA pulverulenta*: foliis obovatis retusis, subtus villosis—pulverulentis. *Smith Brit. I. p. 388. --- Sp. pl. 474 --- Desf. Atl. I. p. 316.*

Anthyllis valentina. Clus. hist. lib. vi. pag. CLXXXVJ.

Genuæ inter saxa al Molo vecchio. Ann.

Petala carnea, emarginata, Flores sessiles, solitarii, axillares, et terminales. Calyx angulato-pyramidatus. Caulis prostratus, ramosissimus. Folia obovata, subtus pulverulenta. Herba facie *Herniariae*.

115. COLCHICUM *autumnale*; foliis planis lanceolatis erectis . *Sp. pl.* 485. α --- *Smith Brit.* I. p. 399 --- *Savi Pis.* I. p. 377 --- *Lam. ill. tab.* 267 --- *Bull. Herb. de la Franc. tab.* 17.

Genuæ in pratis collinis *allo Zerbino*, a *Pegli*. *Peren.*

Flore albo et purpureo reperitur.

HEXANDRIA POLYGYNIA.

116. ALISMA *plantago*: foliis ovatis, capsulis obtusè trigonis. *Smith Brit.* I. p. 400. α --- *Sp. pl.* 486 --- *Savi Pis.* I. p. 378 --- *Desf. Atl.* I. p. 323 --- *Lam. ill. t.* 272.

Genuæ in fossis sub *Albaro*. *Peren.*

OCTANDRIA MONOGYNIA.

117. EPILOBIUM *angustissimum*: foliis sparsis, lineari—angustissimis, pedunculis unibracteatis.

E. angustissimum. Willd. Sp. pl. 2. p. 313.

E. rosmarinifolium. Jacq. Collect. 2. p. 50.

E. angustifolium γ. Sp. pl. 493.

E. Dodonæi. All. Ped. I. p. 279. n. 1016.

Pseudolysimachium purpureum minus. Dod. Pempt. 85.

Genuæ in summo vertice *il Diamante Porciferam* versus . *Peren.*

118. ERICA *vulgaris*: antheris aristatis inclusis, stylo exerto, corollâ quadripartitâ calyce breviorè, foliis oppositis calcaratis. *Smith Brit.* I. p. 417. α --- *Sp. pl.* 501. α --- *Savi Pis.* I. p. 385 --- *Bull. Herb. de la France tab.* 341. nil pulchrius.

Ubique in collibus siccis sterilibus. *Frutex.*

119. *ERICA arborea*: antheris aristatis inclusis, stylo exerto; corollis campanulatis, foliis subquaternis, ramis junioribus incano-tomentosis.

E. arborea. Sp. pl. 503 -- Savi Pis. I. p. 337.
In collibus et montibus totius Liguriæ. *Arbor.*
Flores albi, odori. Folia terna vel quaterna, tenuissima et fere setacea, glabra, patentia, breviter petiolata, arescendo decidua. Cortex ferrugineus, nec tomentosus, obvestit truncum. Rami juniores lanugine laxiuscula, et incana tomentosi.

Incolæ passim hac utuntur ad combustionem; ob ramulorum enim lanuginem facillimè ignem concipit, licet vix retineat. Vulgò *Stipa*, *Brugo*.

120. *ERICA carnea*: antheris bifidis, exertis; corollis oblongis, collo arctatis; foliis subquaternis; floribus secundis.

E. herbacea. Sp. pl. 501.

E. carnea. Sp. pl. 504.

E. carnea. Scop. Carn. ed 2. tom. I. p. 275.
n. 461 -- Jacq. Aus. I. tab. 32.

Abundat in orientali plaga Liguriæ in montibus *del Bracco* usque *al Borghetto*. *Frutex.*

Caules teretes, ramosi, diffusi, glabri, unum duos pedes longi. Folia verticillata quaterna vel terna, linearia, acuminata, glabra, patentia, nervo dorsali prominenti, ut triangularia videantur, breviter petiolata, tuberculo ad basim petioli. Rami juniores terminantur strobilo ex foliis latioribus, ciliatisque. Flores in racemo terminali, secundo, folioso. Pedunculi uniflori, 1--3 in quavis axilla, squamulis basi cincti, tribus-

que bracteolis vix ultra medium instructi. Flores autumnales imperfecti, clausi, ovales, albo -- virentes tum ipsi, tum eorum pedunculi, et foliorum tubercula; adventante vere, hi iidem flores perficiuntur, plus minus saturatè carnei fiunt; pedunculi et foliorum tubercula rubent. Tunc corollæ sunt tubulosæ, collo aretatae, quadridentatae. Foliola calycina lanceolato--linearia, acuminata, stricta, carnea, corollâ dimidio breviora. Antheræ exertæ, nigricantes, bifidæ, segmentis approximatis. Stylus, elapsis nuptiis, declinatus. Planta glabra; flores pulcherrimi.

Parum certè videntur novisse hanc plantam auctores illi, qui eam in duas species *herbaceam*, et *carneam* dispescuerunt, animadversione facta ad florescentiam imperfectam autumnalem, et perfectam vernalem. Atqui ne varietatem quidem diversitas ista constituit; aliàs enim omnes plantas, florescentia erumpente, dein perfecta, in duplicem varietatem dirimere oporteret.

OCTANDRIA TRIGYNIA.

121. *POLYGONUM maritimum*: floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis sempervirentibus, caule suffrutescente. *Sp. pl.* 519 -- *Desf. Atl.* I. p. 332 -- *Savi Pis.* I. p. 395 -- *Hort. Rom.* t. 8. tab. 59.

P. maritimum. *J. Bauh. hist.* 3. lib. 29. p. 376. et 377.

In littore a *Sestri di Ponente.* *Peren.*

122. *POLYGONUM convolvulus*: foliis cordato-

-sagittatis, caule volubili angulato, laci-
niis calycinis obtusè carinatis. *Smith Brit.*

I. p. 430 --- Sp. pl. 522.

Convolvulum nigrum. Dod. Pempt. 396.

*In via inter lo Sperone, et i due Fratelli loco
humanti. Ann.*

DECANDRIA MONOGYNIA.

123. *DICTAMNUS albus. Sp. pl. 548 --- Pollich*

Palat. I. p. 401 --- Lam. ill. tab. 344 ---

Jacq. Austr. 5. tab. 428.

Fraxinella Clus. Garid. Aix. p. 191. tab. 36.

In collibus al Lagazzo. Peren.

Folia inferiora simplicia, minora, superiora

pinnata. Petioli basi incrassati. Tota plan-

ta pubescens, foliaque subtus magis. Pili

in superiori plantæ parte apice glandulosi,

ut plurimum rubentes, resinam graveo-

lentem fundentes.

124. *TRIBULUS terrestris: foliolis sexjugatis,*

subæqualibus; seminibus quadricornibus.

Sp. pl. 554 --- Desf. Atl. I. p. 339 --- Savi

Pis. I. p. 404.

Tribulus terrestris minor incanus hispanicus.

Barel. ic. 558.

Inter Pegli et Voltri in via publica. Ann.

DECANDRIA DIGYNIA.

125. *SAPONARIA vaccaria: calycibus pyra-*

midatis quinquangularibus, foliis ovatis,

acuminatis, sessilibus. Sp. pl. 585.

Saponaria rubra. Fl. Franç. 2. n. 561. VIII.

Vaccaria. Dod. Pempt. 104.

Vaccaria rubra major et minor. *Lugd. Hist.*

I. p. 545.

Genuæ locis herbidis *all' Acquasola. Ann.*

126. *SAPONARIA ocymoides* : calycibus cylindricis villosis , caulibus dichotomis procumbentibus. *Sp. pl.* 585 --- *Savi Pis. I.* p. 410 --- *Desf. Atl. I.* p. 143 --- *Cavanil. Ic. et Descr.* 2. p. 29. n. 146. t. 134 --- *Jacq. Austr.* 5. *Ap. tab.* 23.

Ocymoides repens polygoni folio. *Lugd. hist.*

2. p. 1429.

Saponaria minor quibusdam. *J. Bauh. hist.*

3. lib. 29. p. 344.

In rupibus ad marginem viæ publicæ supra

Gavi. Peren.

127. *DIANTHUS carthusianorum*: floribus subaggregatis : squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus , foliis linearibus trinerviis. *Sp. pl.* 586 --- *Savi Pis. I.* p. 411.

Ubique in muris , locisque mari expositis totius Liguriæ. *Peren.*

Squamæ passim vel calyce paullulum breviores , vel æquales , vel longiores apud nos occurrunt ; hinc definitio Linnæana omnibus præferenda. Flores nunc dense fasciculati , nunc subsolitarii. Petala semper superne pilosa. Folia linearia , angusta , trinervia , nervis lateralibus obsoletis.

In montibus *di Voltri* supra l' *Acqua--Santa* reperi hunc eundem *Dianthum* caule unifloro , humili , squamisque ovatis , aristatis , calyce plusquam dimidio brevioribus , ut pro nova imposuisset planta , nisi florum pili , et folia trinervia speciem detexissent.

DECANDRIA TRIGYNIA.

128. *SILENE nocturna* : floribus spicatis alternis secundis sessilibus , petalis bifidis. *Sp. pl.* 595.

Cucubalus spicatus . *Fl. Franc.* 3. n. 675. xxviii. a.

Lychnis sylv. hirsuta elatior spicata lini colore. *Barrel. Ic.* 1027. fig. I.

Lychnis segetum meridionalium annua hirsuta floribus albis uno versu dispositis. *Moris. ox. s.* 5. tab. 36.

Genuæ in mœniis *alla Cava*, et extra porta *m dello Zerbino. Ann.*

129. *SILENE inflata* : floribus paniculatis cernuis , petalis semibifidis subnudis , calycibus glabris reticulato — venosis , caule erecto. *Smith. Brit.* 2. p. 467.

Cucubalus behen. Sp. pl. 591. a --- *Engl. Bot.* 3. t. 164 --- *Savi Pis.* I. p. 415 --- *Desf. Atl.* I. p. 347 --- *Lam. Ill. tab.* 377. fig. 2. --- *Bull. Herb. de la France tab.* 321.

Lychnis sylvestris , quæ *behen album* vulgò. *Hort. Rom.* 6. t. 29.

Genuæ in littore *alla Foce. Peren.*

130. *STELLARIA media* : foliis ovatis , caulibus procumbentibus, linea laterali pilosa alternata. *Smith Brit.* 2. p. 473.

Alsine media Sp. pl. 389 --- *Desf. Atl.* I. p. 271 --- *Lam. ill. tab.* 214.

Alsine major. Fuchs. hist. 21.

Genuæ in hortis *Ann.*

131. *ARENARIA marina* β. *Smith Brit.* 2. p. 480.

Arenaria media. Sp. pl. 606.

Arenaria marina. Savi. Pis. I. p. 422.

Spergula marina nostras. *J. Bauh. hist.* 3. lib. 36. p. 722.

Spergula marina. *Lugd. hist.* 2. p. 1385.

Genuæ in mœniis *alla Darsena. Ann.*

Pedunculi et calyces pubescenti--viscosi. Caulis prostrati, compressi, glaberrimi. Folia mutica, carnosa, semicylindrica, supra sulcata, glabra.

DODECANDRIA DIGYNIA.

132. *AGRIMONIA eupatoria* : foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis. *Sp. pl.* 643 — *Smith Brit.* 2. p. 511. — *Bull. Herb. de la Franc. tab.* 229.

Eupatorio di Dioscoride. *Imp. Hist. Nat. ed. Ven.* p. 656.

Genuæ in collibus *allo Zerbino. Peren.*

DODECANDRIA TRIGYNIA.

133. *RESEDA lutea* : foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis, calyce sexfido. *Smith Brit.* 2. p. 513. — *Sp. pl.* 645. — *Desf. Atl.* I. p. 374 — *Lam. ill. tab.* 410 — *Jacq. Austr.* 4. p. 353 — *Bull. Herb. de la France. tab.* 281.

R. lutea. Lugd. hist. 2. p. 1199.

Genuæ in collibus extra portam *dello Zerbino. Ann.*

134. *EUPHORBIA peplis* : foliis subintegerrimis semicordatis, floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus, capsula lævi. *Smith Brit.* 2. 513 — *Sp. pl.* 652 — *Savi Pis.* I. p. 451 — *Desf. Atl.* I. p. 377. *Peplis. Clus. hist. lib.* VI. p. CLXXXVI.

- A Sestri di Ponente in littore. Ann.*
135. EUPHORBIA *exigua*: umbellâ decompositâ; involucellis lanceolatis; foliis linearibus acutis retusisve.
E. exigua. Sp. pl. 654. α. β. γ. — Smith Brit. 2. p. 515.
Peplis minor. Lugd. Hist. 1659.
Euphorbia retusa. Cav. Ic. et Descr. I. p. 21. tab. 34. f. 3.
Tithymalus exiguus saxatilis. Mag. Bot. Monsp. p. 259. cum ic.
Genuæ in collibus al Lagazzo. Ann.
Caules in locis siccis bi-triunciales. Folia linearia, integerrima, in eodem individuo nunc apice truncata, et emarginata cum acuminulo terminali, nunc rotundata, nunc acuta, cæterum sparsa, sessilia, inferiora imbricata, minora, crebriora. Umbella parva, terminalis, 3 -- 5 -- fida, deinde bifida cum flosculo ad divisionem. Involucra et involucella cordato--lanceolata, acuta. Petala quatuor parva, lunulata, rubro--purpurea, apicibus luteolis. Capsulæ glabræ, maturæ in latus deflexæ. Planta glabra, subglauescens.
136. EUPHORBIA *spinosa*: umbellâ subquinquefidâ simplici, involucellis ovatis, primariis triphyllis; foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Sp. pl. 655 -- Savi Pis. I. p. 454 -- Desf. Atl. I. p. 380. sine var.*
E. pungens; umbella subquinquefida, simplici; foliis oblongis integerrimis; caule fruticoso; ramulis senescentibus pungentibus. Enc. Titimalo del monte di S. Giuliano. Zann. hist. ed. Monti p. 220. tab. 171.
In monte Ramazzo. Peren.

137. *EUPHORBIA paralia*: umbellâ subquinquefidâ, bifidâ; involucellis cordato-reniformibus, foliis sursum imbricatis concavis. *Smith Brith.* 2. p. 516 --- *Engl. Bot.* 3. tab. 195.

E. paralias. *Sp. pl.* 657 -- *Savi Pis.* 1. p. 455 -- *Desf. Atl.* 1. p. 281 -- *Jacq. Hort. Vind.* tom. 2. tab. 188.

Tithymalus paralius ex locis maritimis. *Dod. Pempt.* 370.

Genuæ alla Foce, et a Sestri di Ponente in littore. *Peren.*

In plantis junioribus folia sunt imbricata, sed in adultis patent, ut in icone *Jacquini.*

138. *EUPHORBIA epythymioides*: umbellâ decompositâ; involucellis ovatis; foliis lanceolatis, superioribus acutis.

E. epythymioides. *Sp. pl.* 656 -- *Jacq. Austr.* 4. tab. 344.

Communis al Lagazzo, et secus aquæductum dello Zerbino. *Perenn.*

Valdè affinis *E. dulci* L., sed in *epythymioide* folia superiora sunt lanceolata, acuta, nec elliptica, obtusa et apice rotundata, involucella sunt ovata, basi rotundata vel cuneata, nec triangularia.

139. *EUPHORBIA cyparissias*: umbellâ multifidâ, dichotomâ; involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis, caulinis lanceolatis. *Sp. pl.* 661 -- *Smith Brit.* 2. p. 519 -- *Jacq. Austr.* 5. tab. 435 -- *Bull. Herb. de la Franc.* tab. 97.

In collibus al Lagazzo. *Peren.*

140. *EUPHORBIA characias*: umbellâ multifidâ, dichotomâ: involucellis perfoliatis,

foliis lanceolatis mollissimè pubescentibus, capsulâ pilosâ. *Smith Brit.* 2. p. 521 -- *Sp. pl.* 662 -- *Savi Pis.* I. p. 459.

Tithymalus characias folio lanuginoso. *C. B. P.* 290.

Tithymalus fruticosus sempervirens, salicis folio glauco non serrato, et mollissima lanugine asperso, florum sectionibus quaternis, reniformibus, atro-rubentibus, fructu piloso. *Targ. Viag. in Tosc. tom.* 5. p. 278.

Genuæ in mœniis *alla Cava. Peren.*

Folia, et caulis mollissimè pubescunt. Lac venenum piscibus. Hoc ad illos necandos quotannis utuntur in amne Macra in ditissima illa piscatione dicta *dell' Erba lazza.*

ICOSANDRIA PENTAGYNIA.

141. *PYRUS aria*: foliis simplicibus ovatis incisis seriatis lineatis, subtus tomentosis, floribus corymbosis subdigynis. *Smith Brit.* 2. p. 534.

Cratægus aria. Sp. pl. 681 -- *Lam. ill. tab.* 433. fig. 1

Sorbus aria. Crantz. Austr. p. 86. n. 3. tab. 2. f. 2.

Ad radices montis *Gneo*, in cujus superficie copiosè efflorescit amiantus. *Arbor.*

142. *SPIRAEA filipendula*: foliis interruptè pinnatis, foliolis uniformibus serratis glabris, caule herbaceo, floribus cymosis polygynis. *Smith Brit.* 2. p. 535 -- *Engl. Bot.* 4. t. 284 -- *Sp. pl.* 702 -- *Savi Pis.* I. p. 469 -- *Lam. ill. tab.* 439. fig. 1.

Filipendula. Dod. Pempt. 56.

Genuæ in collibus *al Lagazzo. Peren.*

143. *POTENTILLA verna* : foliis radicalibus
quinatis acutè serratis retusis ; caulinis ter-
natis, caule declinato. *Sp. pl.* 712 -- *Smith*
Brit. 2. p. 550.

Fragaria verna. *Crantz. Austr.* I. p. 74. tab.
1. fig. 1.

In pascuis collinis supra *Oreggina.* *Peren.*

Vix conveniunt auctores in descriptione hujus
speciei. Foliola semper apice retusa ob den-
tem terminalem lateralibus minorem, in
foliis radicalibus quinata, in caulinis sæpe
variant. Calycis foliola alternè minora, et
paullulum breviora. Petala aurea, emargi-
nata, calyce longiora. Caules, petioli,
calyces apud nos hirsuti pilis longiusculis.
Folia subtus magis pubescentia.

144. *TORMENTILLA officinalis* : caule ere-
ctiusculo ramoso, foliis sessilibus. *Smith*
Brit. 2. p. 552.

T. erecta. *Sp. pl.* 716 -- *Lam ill. tab.* 444.

Potentilla tormentilla. *Savi Pis.* I. p. 483.

Tormentilla sylvestris. *Garid. Aix.* p. 468.
tab. 103.

In collibus secus torrentem *Leira.* *Peren.*

POLYANDRIA MONOGYNIA.

145. *CAPPARIS spinosa* : pedunculis solitariis
unifloris, stipulis spinosis, foliis annuis,
capsulis ovalibus. *Sp. pl.* 720. a -- *Savi Pis.*
2. p. 2 -- *Desf. Atl.* I. p. 403 -- *Smith*
Colour. Fig. of. rar. pl. p. 18. tab. 20. --
Lam. ill. t. 446.

Ubique in muris ad mare. *Frutex.*

146. *GLAUCIUM luteum* : caule glabro, foliis

caulinis repandis, siliquâ tuberculato--scabriusculâ. *Smith Brit.* 2. p. 563.
Chelidonium glaucium. *Sp. pl.* 724 -- *Savi Pis.* 2. p. 3 -- *Desf. Atl.* I. p. 405.
Papaver corniculatum flavo flore. *Clus. Hist. lib.* v. p. xci.

A Sestri di Ponente in littore, et in Feritoris alveo. *Ann.*

147. *CISTUS fumana*: suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis alternis, linearibus margine scabris, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 740 -- *Savi Pis.* 2. p. 11 -- *Jacq. Austr.* 3. tab. 252.

Genuæ in mœniis Feritorem versus, tum in collibus *al Lagazzo.* *Frutex.*

Caulis nunc procumbens, nunc erectus. Folia vel margine aspera spinulis minutissimis vel omnino nuda. Foliola calycina quinque, duo exteriora longè minora.

Cum *Cistus calycinus* ex *Linnaei* sententia tribus tantùm foliolis calycinis distinguatur, quomodo ad hunc referri potest *Cistus fumana* *A. Desf. Atl.* I. p. 414. tab. 105, cujus calyx pingitur quinquephyllus?

POLYANDRIA POLYGYNIA.

148. *ANEMONE hortensis*: foliis digitatis. *Sp. pl.* 761.

A. stellata. *Savi Pis.* I. p. 19.

A. hortensis latifolia simplici flore 3. *Clus. Hist. lib.* 2. p. 249.

A. prima. *Dod. Pemp.* 434.

A. latifolia saniculæ folio. *Hort. Rom.* 5. tab. 35.

Ubique in collibus Genuensibus. *Peren.*

Folia involucri nunc integra, nunc incisa.

149. *ANEMONE trifolia*: foliis ternatis ovatis

integris, serratis, caule unifloro. *Sp. pl.* 762.

A. trifolia. *Dod. Pempt.* 436.

A. trifolia flore albo. *J. Bauh. hist.* 3. lib. 30. p. 412.

In collibus Poreiferæ ad cænobium il *Boschetto*, tum ad radices montium *Gneo*, et *Ramazzo*. *Peren.*

Radix horizontalis. Scapus teres, erectus, tenuis, usque ad sex vel octo pollices longus, dempto involucrio, nudus. Folia e radice, a caule secreta, ternata, petiolata. Foliola sessilia, ovata vel lanceolata, acuta, infernè integra, reliquo margine dentata, lateralibus basi obliquis, intermedio cuneato. Petiolus tres quatuor pollices longus. Involucrum e tribus foliis ternatis, verticillatis, breviter petiolatis, duos circiter pollices a flore dissitum; foliola radicalibus similia. Flos solitarius, terminalis. Petala sex alba, interdum subtus rosea, ovato-oblonga, obtusa, integra, patentia. Stamina alba, corollâ breviora. Filamenta inæqualia, capillaria. Germina ovata, acuta viridia, leviter pubescentia. Planta plus minus pubescens.

150. ANEMONE nemorosa: scapo involucrato unifloro, involucrio triphylo petiolato foliaceo, seminibus ecaudatis, foliolis incis. *Smith Brit.* 2. p. 581 --- *Sp. pl.* 762 --- *Bull. Herb. de la France. tab.* 3.

Ranunculus sylvarum. *Clus. hist. lib.* 11. p. 247.

Secus aquæductum dello *Zerbino* prope duos pontes. *Peren.*

Radix horizontalis. Folia ternata vel quinata, foliolis inciso-dentatis, involucri terna. Pe-

- tala alba , sæpe extus rosea. Filamenta al-
bida , antheris luteis. Germina ovato--acu-
ta , pubescentia , viridia.
151. *THALICTRUM minus* : foliis tripinnatis ,
foliolis trifidis dentatisque , glaucis ; flori-
bus paniculatis cernuis.
- T. minus* *Sp. pl.* 769 --- *Smith Brit.* 2. p.
584. 4. --- *Jacq. Austr.* 5. tab. 419.
- Thalictrum alpinum minus saxatile* , rutæ fo-
lio , staminibus luteis. *Segui. Veron.* 1. p.
476. tab. 11. *Sup. p.* 307. n. 476.
- Genuæ in collibus *al Lagazzo. Peren.*
152. *RANUNCULUS ficaria* : foliis cordatis ,
angulatis , petiolatis , petalis numerosis.
- Smith Brit.* 2. p. 589 --- *Sp. pl.* 774. 4. ---
Bul. Herb. de la France tab. 43.
- Chelidonium minus. Fuchs. hist.* 867.
- Ubique. *Peren.*
153. *RANUNCULUS bulbosus* : calycibus retro-
flexis , pedunculis sulcatis , caule erecto
multifloro , foliis compositis , radice bul-
bosa. *Smith Brit.* 2. p. 591 --- *Sp. pl.* 778
--- *Savi Pis.* 2. p. 26 --- *Fl. Dan.* tab. 551 ---
Bull. Herb. de la France tab. 27.
- Ranunculus tuberosus. Dod. Pempt.* 431 ---
Lob. ic. 667. : *ANEMONE* 150.
- In collibus *al Lagazzo. Peren.*
154. *HELLEBORUS viridis* : caule multifloro
folioso , foliis digitatis , petalis patentibus.
- Smith Brit.* 2. p. 598 --- *Engl. Bot.* 3. t.
200 --- *Sp. pl.* 784 --- *Savi Pis.* 2. p. 30 ---
Jacq. Austr. 2. tab. 106.
- Ubique locis collinis sylvaticis , etiam in mon-
tibus *del Bracco* in plaga orientali Ligu-
riæ. *Peren.*
155. *HELLEBORUS foetidus* : caule multifo-

ro folioso, foliis pedatis petalis conniventibus. *Smith Brit.* 2. p. 598 --- *Sp. pl.* 784
 * -- *Savi Pis.* 2. p. 31 -- *Bull. Herb. de la France tab.* 71.

Helleborus niger foetidus. *Hort. Rom. tab.* 27.
 In canalibus frequens. *Peren.*

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

156. *SATUREJA montana*: pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis. *Sp. pl.* 794 --- *Scop. Carn.* I. p. 428. *tab.* 30 -- *Savi Pis.* 2. p. 40.

A Voltri supra *l' Acqua Santa*; copiosè in montibus *del Bracco* in orientali plaga *Liguriae*. *Peren.*

157. *MENTHA rotundifolia*: spicis subhirsutis interruptis, foliis ellipticis obtusis rugosis crenatis subtus villosis, bracteis lanceolatis. *Smith Brit.* 2. p. 611. a -- *Sp. pl.* 805. *Savi Pis.* 2. p. 46 --- *Desf. Atl.* 2. p. 16.

M. rugosa. *Fl. Franc.* 2. n. 454. VII.

Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato, odore gravi. *J. Bauh. hist.* 3. lib. 28. p. 219.

Ubique secus aquas, et locis humidis. *Peren.*

158. *MENTHA hirsuta*: floribus capitatis verticillatisve, foliis petiolatis ovatis, calyce undique hirsuto, pedicellis retrorsum hispidis. *Smith Brit.* 2. p. 616. *

M. n. 4. *Hort. Ciff.* 306.

M. aquatica. *Savi Pis.* 2. p. 47 -- *Desf. Atl.* 2. p. 17 --- *Lam. ill. t.* 503. f. 1.

Mentha aquatica sive *sisymbrium hirsutius* *J. Bauh. hist.* 3. lib. 28. p. 224.

Secus torrentem *Leira a Voltri. Peren.*

159. *GALEOPSIS ladanum* : internodiis caulinis æqualibus , foliis lanceolatis subserratis hirtis, corollæ galeâ obsoletè crenatâ. *Smith Brit. 2. p. 628. a --- Sp. pl. 810 --- Savi Pis. 2. p. 53 --- Lam. ill. tab. 506. fig. 2.*
Ladanum segetum. Lugd. Hist. I. p. 443.

Frequens Genuæ sub mœniis extra portam *dele Chiappe* usque ad ipsam arcem *il Diamante*, ubi verè pusilla reperitur. *Ann.*

160. *BETONICA officinalis* : spicâ interruptâ, corollarum laciniâ labii intermediâ emarginatâ. *Sp. pl. 810 --- Smith Brit. 2. p. 632 --- Savi Pis. 2. p. 54 --- Bull. Herb. de la France tab. 41.*

Betonica. Dod. Pem. 40 --- Hort. Rom. 3. tab. 83.

Secus *Leira a Voltri. Peren.*

161. *CLINOPODIUM vulgare*: verticillis hispidis, bracteis setaceis, pedicellis ramosis, foliis obsoletè serratis. *Smith Brit. 2. p. 638 Sp. pl. 821. a --- Savi Pis. 2. p. 58 --- Desf. Atl. 2. p. 26 --- Lam. ill. tab. 511. fig. 1 --- Hort. Rom. 3. tab. 65.*

Secus *Leira. Peren.*

162. *ORIGANUM vulgare*: spicis subrotundis paniculatis conglomeratis glabris, involucris ovatis calyce longioribus. *Smith Brit. 2. p. 639 --- Sp. pl. 824 --- Savi Pis. 2. p. 60. --- Hort. Rom. 3. tab. 75 --- Bull. Herb. de la Franc. t. 193.*

Secus *Leira. Peren.*

163. *THIMUS nepeta*: verticillis pedunculatis multifloris dichotomis folio longioribus, foliis serratis, villis calycinis prominentibus. *Smith Brit. 2. p. 642.*

Melissa nepeta. Sp. pl. 828. a.

Calamintha nepeta. *Savi Pis.* 2. p. 63.

Ubique in collibus. *Peren.*

Distinguitur a *Melissa calamintha* L. racemis inferioribus folio valdè longioribus, foliis et floribus minoribus, odore *Menthae pulegii*; in reliquis convenit.

164. *PRUNELLA vulgaris* β. *grandiflora*. *Sp. pl.* 837.

P. grandiflora. *Pollich Palat.* 2. p. 174.

Brunella. *Lam. ill. tab.* 516. *fig.* 1.

Prunella I. *Clus. Hist. lib.* IIII. p. XLIII.

In montibus inter *lo Sperone*, et *i Due Fratelli*. *Peren.*

Flos amplus. Calycis labium superius profundè tridentatum. Caulis et foliorum dimensio, ut in *P. vulgari* *Sp. pl.*

Prunella grandiflora *Jacq. Austr.* 4. p. 40. t. 377. varietatem sistit foliis superioribus pinnatifido-laciniatis, quam nondum apud nos observavi.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

165. *EUPHRASIA officinalis*: foliis ovatis linearis argutè dentatis. *Sp. pl.* 841---*Smith Brit.*

2. p. 650---*Savi Pis.* 2. p. 71---*Lam. ill.*

t. 518. f. 2. --- *Hort. Rom.* 3. tab. 9---*Bull.*

Herb. de la Franc. tab. 233.

In montibus inter *lo Sperone*, et *i Due Fratelli*. *Ann.*

Flores sessiles, axillares, solitarii, valdè approximati in summitate caulis et ramorum.

Calycis laciniae acuminatae. Corolla vel alba striis longitudinalibus purpureis, vel pallidè purpurea iisdem striis obscurioribus.

Labium superius fornicatum, apice bifido,

laciniisque dentatis retroflexis. Labium inferius planum, trifidum, laciniis æqualibus, bilobis, integris, fauce luteum.

166. EUPHRASIA *lutea*: foliis linearibus serratis, superioribus integerrimis. *Sp. pl.* 842 --- *Desf. Atl.* 2. p. 35 --- *Jacq. Austr.* 4. t. 398. sine foliis caulinis inferioribus.

Euphrasia sylvestris -- *Moris. Ox. s.* 11. t. 24. f. 16. bene folia caulina.

Sideritis pratensis lutea. *Lugd. hist.* 2. p. 1121. bene folia ramea.

In collibus secus *Leira. Ann.*

Folia caulina lanceolato-linearia serrata, citò pereuntia; ramea linearia, integra, recurva.

Flores lutei. Stamina exerta.

167. ANTIRRHINUM *spurium*: foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 851 --- *Smith Brit.* 2. p. 657 --- *Engl. Bot. tab.* 691 --- *Savi Pis.* 2. p. 76.

Verbasculum quorundam. *Lug. his.* 2. p. 1303.

Genuæ in littore *alla Foce* sub mœniis. *Ann.*

168. ANTIRRHINUM *linaria*: foliis lanceolato-linearibus, confertis, caule erecto spicato, calycibus glabris calcari brevioribus. *Smith Brit.* 2. p. 660. a. --- *Engl. Bot. tab.* 658 --- *Sp. pl.* 858 --- *Savi Pis.* 2. p. 77 --- *Bull. Herb. de la France t.* 261.

Linaria prima. *Dod. Pempt.* 183.

Genuæ ubique in hortis, et collibus cultis. *Perenn.*

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

169. MYAGRUM *rugosum*: siliculis sulcatis pilosis rugosis; foliis inferioribus lyratis dentatis.

Rapistrum rugosum. *All. Ped.* 1. p. 257. n. 940. t. 78.

Myagrum rugosum. *Sp. pl.* 893.

Genuæ in herbis *all' Acquasola. Ann.*

170. *MYAGRUM hispanicum*: siliculis levibus, fulcro sterili, attenuato suffultis; foliis inferioribus lyratis.

M. hispanicum. *Sp. pl.* 893.

Genuæ cum præcedenti. *Bien.*

Caulis subtripedalis ramosus teres erectus, striatus, sparsus pilis raris deflexis, et adpressis. Folia inferiora lyrata, inæqualiter dentata, lobo terminali maximo, obtuso, rotundato, in successivis foliis angustiori lanceolato. Folia floralia indivisa, lanceolato-linearia. Flores alterni in racemis virgatis, inferiores primores. Pedunculi brevissimi. Petala lutea, calyce longiora. Silicula glabra, stricta, constans e fulcro tereti, attenuato, sterili, quatuor quinque lineas longo, utrinque nervo marginali e silicula superiori decurrente instructo, collo arctato, dein dilatato in siliculam ovato-acutam, subcompressam, brevissimo stylo terminatam, vix sesquilineam longam.

171. *MYAGRUM sativum*: siliculis obovatis pedunculatis polyspermis. *Sp. pl.* 894. a -- *Cavanil. Ic. et Descr.* 1. p. 47. n. 72. tab. 66.

Alyssum sativum. *Smith Brit.* 2. p. 679.

Cum præcedentibus. *Ann.*

172. *DRABA verna*: scapis nudis, petalis bipartitis; foliis lanceolatis subincisis hirtis. *Smith Brit.* 2. p. 677 -- *Sp. pl.* 896 -- *Savi Pis.* 2. p. 86 -- *Santi. Viag. al Montam.* p. 112.

Alysson. *Segui. Veron.* 1. p. 375. n. 2. t. 4. f. 3.
Ubique. *Ann.*

173. *LEPIDIUM petraeum*: foliis pinnatis, foliolis integerrimis; canle folioso; siliculis ovato-oblongis, retusis.

L. petraeum. Sp. pl. 899 -- *Smith Brit.* 2. p. 681 -- *Engl. Bot.* 2. t. 111 -- *Jacq. Austr.* 2. t. 131.

Cardamine pusilla saxatilis montana discoi-
des. Column. Ecphr. I. p. 274. tab. 273.

Genuæ in mœniis alla Darsena. Ann.

Caules filiformes, unus-plures ex eadem radice, vel diffusi, vel erecti, simplices aut infernè tantùm ramosi, ramis patulis. Folia petiolata, pinnata cum impari, interdum simplicia. Foliola admodum parva, ovata, utrinque attenuata, integerrima, impari majore. Flores in longo raroque racemo terminali, pedunculo bilineari suffulti. Calyx diffluus, foliolis ovatis, concavis, parvis. Petala alba, alternantia cum foliolis calycinis, iisdem angustiora, sed longitudine æqualia, vix sensibiliter emarginata. Antheræ luteæ. Silicula ovato-oblonga, apice fere truncata, et subemarginata. Flores inferiores primores; planta glabriuscula.

Smithius, et *Jacquinus* pingunt l. c. plantam luxuriantem, in qua pinnulae foliorum sunt numerosiores quàm in nostra inter saxa loco sterilissimo orta, et vix tribus quatuorve pinnulis gaudente. In reliquis ambæ adamussim conveniunt.

174. *LEPIDIUM iberis*: foliis inferioribus lanceolatis serratis; superioribus linearibus integerrimis. *Savi Pis.* 2. p. 88 -- *Sp. pl.* 900.
Iberis. Dod. Pempt. 715.

- Lepidium, sive iberis herbacea, foliis lanceolatis acuminatis. *Hort. Rom.* 4. t. 14.
Ubique in semitis. *Ann.*
175. THLASPI *Bursa pastoris*: hirsutum, siliculis deltoideo--obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Smith Brit.* 2. p. 687 --- *Sp. pl.* 903 --- *Savi Pis.* 2. p. 90 --- *Bul. Herb. de la France tab.* 223.
Pastoria Bursa. *Fuchs. hist.* 611.
Ubique. *Ann.*
176. COCHLEARIA *draba*: foliis caulinis lanceolatis dentatis, amplexicaulibus. *Sp. pl.* 904 --- *Savi Pis.* 2. p. 91 --- *Jacq. Austr.* 4. t. 315.
Arabis seu Draba Matthioli. *Lugd. Hist.* 1. p. 664.
Genuæ in herbidis *all' Aquasola*; ubique in *Albaro.* *Peren.*
177. IBERIS *umbellata*: herbacea, foliis lanceolatis acuminatis; inferioribus serratis, superioribus integerrimis. *Sp. pl.* 906 --- *Savi Pis.* 2. p. 92.
Thlaspi Candiaë umbellatum iberidis folio. *Lob. ic.* 216.
Arabis seu Draba Dodonæi, seu Thlaspi Creticum. *Lugd. Hist.* 1. p. 664.
In montibus statim supra *l' Acqua Santa a Voltri.* *Ann.*
178. ALYSSUM *maritimum*: caulibus suffruticosis, staminibus muticis, foliis lineari--lanceolatis. *Savi Pis.* 2. p. 94.
Clypeola maritima. *Sp. pl.* 910 --- *Desf. Atl.* 2. p. 72.
Thlaspi maritimum. *Lugd. Hist.* 2. p. 1393.
In mœniis maritimis Genuæ. Floret tota hyeme. *Peren.*

179. **BISCUTELLA** *laevigata* : siliculis glabris, foliis lanceolatis serratis. *Linn. Mant.* 255--- *Desf. Atl.* 2. p. 74 --- *Jacq. Austr.* 4. t. 339.

Leucojum alyssoides umbellatum montanum
F. C. *Barrel. ic.* 253. f. 2.

In monte *Ramazzo Ann.*

180. **BUNIAS** *cakile* : siliculis ovatis ancipitibus levibus monospermis, foliis carnosiss. *Smith Brit.* 2. p. 694 --- *Engl. Bot.* 4. p. 231. tab. 231 --- *Sp. pl.* 936 --- *Savi Pis.* 2. p. 108.

Cakile maritima. *Willd. Sp. pl.* 3. p. 416---
Desf. Atl. 2. p. 77. excl. var.

Cakile serapionis erucæ folio, napi flore; vulgo eruca marina. *Lob. ic.* 223.

Cakile quibusdam, aliis eruca marina, et *Raphanus marinus.* *J. Bauh. hist.* 2. lib. 21. p. 867.

A Sestri di Ponente in littore. *Ann.*

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

181. **CARDAMINE** *hirsuta* : foliis pinnatis, pinnis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis, petiolis infernè ciliatis. *Santi Viag. al Montam.* p. 249. cum optima descr.

C. hirsuta : foliis pinnatis exstipulatis : foliolis rotundato-oblongis incisis petiolatis. *Smith Brit.* 2. p. 698 --- *Sp. pl.* 915---*Savi Pis.* 2. p. 96 --- *Desf. Atl.* 2. p. 80. --- *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 2. p. 21. tab. 38.

Cardamine. 4. *Daiechamp. Lugd. Hist.* 1. p. 659.

C. sylvestris minor Italica. *Barrel. ic.* 455.

Ubique cum *Draba verna*. *Ann.*

Observavi stamina 4--5--6 etiam in eodem individuo. Petiolo communi infernè ciliato, et foliolis iterum petiolatis ab affinibus distincta.

182. *SISYMBRIUM nasturtium*: siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis cordato--subrotundis. *Smith Brit.* 2. p. 700. *a* --- *Sp. pl.* 916 --- *Savi Pis.* 2. p. 98 --- *Bull. Herb. de la Franc.* tab. 302.

Sisymbrium cardamine primum cressio vulgaris *Matth. Lugd. hist. tom. 1 p. 658.*

Cratevæ Sion erucæfolium. *Lob. Ic.* 209.

In palustribus *sub Albaro*. *Peren.*

183. *ERYSIMUM officinale*: siliquis rachi adpressis, foliis runcinatis. *Smith Brit.* 2. p. 706. --- *Sp. pl.* 922 --- *Savi Pis.* 2. p. 100 --- *Bull. Herb. de la France* tab. 259.

Ubique in viis campestribus. *Ann.*

184. *CHEIRANTHUS incanus*: foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Sp. pl.* 924.

Leucojum purpureum vel rubrum. *Hort. Rom.* 4. tab. 26.

Genuæ in mœniis maritimis prope la Cava.
Frutex.

Tota planta incano--tomentosa. Folia lanceolata, integerrima obtusa. Flores purpurei odori, fauce albidii. Siliquæ compressæ, apice truncatæ.

185. *TURRITIS sagittata*: infernè hirsuta; foliis radicalibus ovato--oblongis, petiolatis, caulinis sessilibus sagittatis; siliquis compresso--planis.

Arabis hispida. *Enc. excl. Lin. syn.*

Turritis. Segu. Veron. 1. p. 383. n. 1.

Turritis. n. 2. varietas. Ger. Galloprov. p. 367.

Turritis. Lob. ic. 220.

Turrita vulgarior. Clus. Hist. lib. V. p. cxxvj.

Brassica sylvestris foliis integris et hispidis.

C. B. P. 112.

*Genuæ in collibus cultis prope il Lagazzo.
Bien.*

Folia radicalia rosulam super terram faciunt, ovato-oblonga, obtusa, petiolata, dentata; caulina sessilia, alterna, crebra, strictissima, sagittata, auriculis obtusis, nunc dentata vel crenata, nunc subintegra, inferiora ovato-oblonga obtusa, superiora angusta, acuminata. Caulis teres, erectus, etiam bipedalis, simplex, rarò supernè ramosus. Flores parvi, albi, in racemo terminali stricto. Petala patentia. Siliquæ lineares, glabræ, longæ, compresso-planæ, strictissimæ. Tota planta infernè scabra et hirsuta pilis furcatis, supernè glabra.

Hæc species a pluribus auctoribus, præeunte Linnæo, cum *Turritide hirsuta* fuit confusa, a qua sejungenda, ut monet *Smithius* in *Flora Brit. 2. p. 717.*

186. *SINAPIS arvensis*: siliquis multangulis toroso-turgidis, rostro ancipiti longioribus, foliis ovatis sublyratis. *Smith Brit. 2. p. 721* -- *Sp. pl. 933.*

Lampsana vera falsò *Theophrasti Erysimum Dodonæi. Lugd. Hist. 2. p. 542.*

Genuæ in collibus supra Oreggina, al Lagazzo, et in herbidis all' Acquasola. Ann.

Variat plurimùm aspectu pro loco natali; montana enim macrior, hirsuta, et citatæ *Lugd. Hist. iconi* respondens. Semper ta-

men rostro ancipiti totâ siliquâ breviori cognoscenda.

MONADELPHIA PENTANDRIA.

187. *ERODIUM malacoides* : caule herbaceo ; foliis oppositis, cordato--ovatis, lobatis, crenatis ; floribus umbellatis.

E. malacoides. Willd. Sp. pl. 952. n. 30.

Geranium malacoides. Sp. pl. 952--Savi Pis.

2. p. 118 -- Cavanil. Ger. tab. 91. fig. 1.

Genuæ sub la Lanterna. Ann.

Maxima affinitas cum *E. Chio* , ut limites vix inveniam .

MONADELPHIA DECANDRIA.

188. *GERANIUM nodosum* : pedunculis bifloris , foliis oppositis trilobis serratis , capsulis undique pilosis æqualibus. *Smith Brit. 2. p. 730 --- Sp. pl. 953 -- Savi Pis. 2. p. 114 --- Cavanil. Ger. tab. 80. fig. 1.*

In collibus secus Leira a Voltri. Peren.

189. *GERANIUM molle*: pedunculis bifloris alternis oppositifoliis , foliis rotundatis lobatis tomentosis, capsulis corrugatis glabris. *Smith Brit. 2. p. 734 --- Cavanil. Ger. tab. 83. f. 3.*

G. molle. Sp. pl. 955? Smith.

In viis cum sequenti passim. Ann.

Tota planta villis mollibus hirsuta . Nullæ glandulæ rubræ ad folia . Folia caulina inferiora sunt opposita , superiora alterna . Pedunculi oppositifolii, biflori. Calyces mutici. Petala bifida , calyce longiora, rubro--purpurea, saturatiùs striata. Capsulæ rugosæ , glabræ .

190. GERANIUM *rotundifolium* L: petalis leviter emarginatis.

Ubique in viis. *Ann.*

Folia petiolata; inferiora orbiculata, lobato-dentata, dentibus obtusis, superiora reniformia, dentibus acutis, caulina opposita. Glandula rubra in apicibus dentium, et in angulis incisionum. Petioli teretes, superiores successivè breviores. Stipulae lanceolatae, acuminatae, scariosae. Caules plures ex eadem radice, teretes, ad nodos incrassati, decumbentes. Pedunculi axillares, biflori, floribus ante anthesin nutantibus. Bractae parvae ad pedunculi divisionem. Foliola calycina ovato-oblonga, setula rubra brevissima, saepe rubra terminata, sesquilineam, vel duas lineas longa, margine scariosa, dorso trinervia. Petala calyce longiora, leviter emarginata, pallide rosea, unguem versus alba, utrinque ad basim margine pubescentia. Nectaria inter stamina, et calycem. Stamina decem, fertilia. Antherae coeruleae. Capsulae maturae colore plumbeae, hirsutae pilis brevibus undique patentibus, in apice capsularum longioribus. Semina reticulata. Tota planta pubescens, mollis, subviscida. Caulis, et fulera in aprico rubent.

A *G. rotundifolio* *Engl. Bot. tab. 157.* differt tantum petalis leviter emarginatis, glandulisque foliorum rubris, raro deficientibus.

191. GERANIUM *sanguineum*: pedunculis unifloris; foliis quinquepartitis trifidis rotundatis, capsulis apice setosis. *Smith Brit. 2. p. 738.* — *Engl. Bot. tab. 272* — *Sp. pl. 958.* — *Savi Pis. 2. p. III* — *Cavanil. Ger.*

tab. 91. fig. 1 — *Bull. Herb. de la France* tab. 12.

In collibus *al Lagazzo*, et sub *il Diamante*. *Peren.*

DIADELPHIA HEXANDRIA.

192. *FUMARIA capreolata*: spicis laxis, siliquis monospermis globosis, caule petiolis contortis scandente, foliolis cuneatis lobatis. *Smith Brit.* 2. p. 751 — *Sp. pl.* 985 — *Savi Pis.* 2. p. 129 — *Desf. Atl.* 2. p. 125.

Genuæ in littore *alla Foce* sub mœniis. *Ann.*

Caule altiori, scandente super vicinas sepes, foliorum petiolis cirrhorum vice fungentibus, floribus plerumque albis, apice atrorubentibus distinguitur a *F. officinali* L., cui in reliquis omnino similis; nec tamen inficias ibimus dari etiam *Fumariam officinalem* petiolis cirrhiformibus, et caule admodum luxuriante, ut reapse vix sint limites inter utramque.

DIADELPHIA OCTANDRIA.

193. *POLYGALA vulgaris*: floribus cristatis, racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp. pl.* 986 — *Smith Brit.* 2. p. 753 — *Engl. Bot. tab.* 76 — *Savi Pis.* 2. p. 131 — *Vail. Bot. Paris. tab.* 32. fig. 1. — *Bull. Herb. de la Franc. t.* 177.

In collibus supra *Oregina*. *Peren.*

DIADELPHIA DECANDRIA.

194. SPARTIUM *junceum* : ramis oppositis teretibus apice floriferis , foliis lanceolatis .
Sp. pl. 995.

Genista juncea. Savi Pis. 2. p. 138 --- Desf. Atl. 2. p. 137.

Spartium Dioscoridis sive genista. Lugd. Hist. 1. p. 168.

Locis siccis collinis ubique. *Frutex.*

195. SPARTIUM *spinosum*. foliis ternatis , ramis angulatis , spinosis. *Sp. pl.* 997--*Desf. Atl. 2. p. 135.*

Acacia altera Matthioli. Lugd. Hist. 1. p. 162.

Aspalatus secunda trifolia , quæ Acacia secunda Matthiolo trifolia. J. Bauh. hist. 1. lib. xi. p. 575. (pro 375.)

Genuæ in collibus *al Lagazzo*, et supra *Oregina* , copiosè in montibus inter *Framura*, et *Levanto* in orientali plaga *Liguriæ*.
Frutex .

Spinæ demum validæ , infestæ , ferentes flores , et folia. Folia ternata , petiolata , foliolis parvis , obovatis , æqualibus . Flores lutei , inodori , ampli , sed non adeo , ut in *Spartio junceo* , 3--4 , aggregati in superiori nec terminali spinarum parte . Bracteola ovata , leviter emarginata ad basin calycis , et vix illo longior. Calyx brevissimus. Vexillum ovatum , leviter emarginatum. Alæ longitudine vexilli. Carina infernè bipartita , vix alis brevior. *Frutex* validus , ramosus , striatus.

196. GENISTA *pilosa* : foliis obovato--lanceolatis obtusis subtus pilosis , caule tuberculato decumbente inermi. *Smith Brit. 2. p.*

755 --- *Engl. Bot.* 3. tab. 208 -- *Sp. pl.*

999 --- *Jacq. Austr.* 3. tab. 208.

Chamaenista prima. *Clus. hist. lib.* 1. p. 103.

Ad radices montis *Ramazzo*, et in monte
Gneo. *Frutex*.

Caulis prostratus, rarissimè erectus, ramosus, infernè teres, et cortice cinerascenti tectus; ab uno ad tres pedes longus. *Rami* virides, angulati, tuberculis alternis adpersi, ex quibus prodeunt folia simplicia, vel solitaria, vel plura fasciculata, brevissimè petiolata, ovato--lanceolata, parva, pilosa, infernè albida. *Flores* lutei, parvi, axillares, aggregati, 1-4, in tota ramorum longitudine orti. *Pedunculi* breves, uniflori. *Calyx* vix proprio pedunculo longior, trifidus, lacinia inferiori tridentata, pubescens. *Vexillum* emarginatum extus pubescens. *Alæ* glabræ. *Carina* pariter emarginata, extusque pubescens, facilè in duo foliola secedens.

197. *GENISTA januensis*: ramis argutè triquetris, foliis simplicibus, lanceolatis, margine cartilagineis, rameis inferioribus obtusis; leguminibus nudis.

G. januensis. *Viv. Elen. Plant. Hor. Bot. J. C. Dinegr.* p. 10.

Genuæ in collibus *al Lagazzo*, et secus aquæductum *dell Zerbino*. *Frutex*.

Caules erectiusculi, infernè teretes, supernè, ramisque argutè triquetri, intorti. *Folia* simplicia, alterna, subsessilia, glabra, margine cartilaginea, lanceolata, acuta, ramea inferiora breviora, obtusa, crebriora. *Stipula* utrinque una minima setacea ad basim foliorum. *Flores* solitarii, axillares, lutei. *Pedunculi* breves, rubelli, duabus bracteis

setaceis apice instructi. Calyx trifidus, laciniis duabus superioribus divergentibus, inferiori tridentata. Carina basi bipartita. Legumina subfalcata, nuda, polysperma. Tota planta glabra.

An eadem ac *Genista triangularis Willd. Sp. pl?*

Indefessus Ligusticæ Botanices cultor GRIOLLET primus hanc plantam nactus est in collibus Genuensibus.

198. *ONONIS foetens*: caule villosa; ramulis demum spinescentibus; floribus subsolitariis; foliis ternatis, simplicibusve, foliolis obtusis.

O. foetens. All. Fl. Ped. 1. p. 317. n. 1164. tab. 41. fig. 1. excl. syn. Clus. et Jacq.

Genuæ sub *lo Sperone* extra mœnia, tum in montibus *dell' Acqua Santa. Peren.*

Planta erecta, vel adscendens, villosa, viscida, foetens, prius sine spinis, tandem spinosa, ut pluries in loco observavi, quidquid in contrarium sentiat *Allionus*. Differt ab *O. arvensi Engl. Bot. tab. 682.* foliolis obtusis, floribusque minoribus. Distincta quoque est ab *Anonide mitiori prima Clus.*, sive *O. hircina Jacq.* stipulis, foliolisque minoribus, obtusis.

199. *ONONIS minutissima*: floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis glabris, stipulis setaceis, calycibus aristatis corollâ longioribus. *Sp. pl. 1007.*

Anonis lutea montana non spinosa minima. Barrel. ic. 1107.

In collibus supra *Oreggina*, et sub *lo Sperone* Feritorem versus. *Peren.*

Tota planta glabra. Folia ternata, foliolis argutè serrulatis. Caules diffusi.

200. LATHYRUS *sylvestris* : pedunculis multifloris ; foliolis lanceolatis , linearibusve , elongatis ; caule alato.

Genuæ in collibus *allo Zerbino* , *Porta delle Chiappe* ; in montibus inter *lo Sperone* , et *il Diamante*. *Peren.*

Caulis procumbens , ramosus , tetragonus , angulis duobus oppositis alatis. Folia alternata , bijuga , foliolis elongatis , lanceolatis , vel linearibus , acuminatis , supra lætè viridibus , subtus glaucis . Petioli , usque ad foliolorum exortum alati , inde brevi tractu nudi , tandem abeuntes in cirrhum multifidum. Stipulæ semisagittatæ , extremitatibus acuminatis , latæ vel angustæ pro foliolorum ratione. Caulis , et petiolorum alæ corpusculis minutissimis dissitis margine subscabræ. Pedunculi axillares , solitarii , folio longiores , angulosi , nudi , supernè racemosi . Bracteæ minutissimæ ad pedicellorum basim . Flores ampli , pallidè rosei , carinâ albidâ . Legumen glabrum . Tota planta glabra.

Cum hæc planta orta pingui solo gaudeat foliolis latioribus lanceolatis , aprico verò angustioribus linearibus , semper tamen prælongis , ut repetitò observavi : hinc originem duxerunt auctorum aberrationes , vel dissensus super speciem Linnaeanam . En autem eorum concordantiæ.

* *foliis angustis linearibus.*

Lathyrus sylvestris . *Sp. pl.* 1033 -- *Smith. Brit.* 2. p. 765 -- *Savi Pis.* 2. p. 187.

** *foliis latioribus lanceolatis.*

Lathyrus sylvestris. *Scop. Carn.* 2. p. 63. n. 892 -- *Pollich Palat.* 2. p. 304. n. 680.

Lathyrus major latifolia flore majore purpureo speciosior. *Garid. Aix pag. 271. tab. 108.*, quam iconem malè *Linnaeus* in *Sp. pl.*, et *Smithius* in *Fl. Brit.* referunt ad *Lathyrum latifolium*, hic enim foliolis brevioribus, latioribus, ellipticis diversus.

Cæterum excludantur prorsus ab hac specie passim citatæ icones *Dodonæi*, *Clusii*, *Lobellii*, *Jo. Bauhini*, *Morisoni*, quia illam nullimodè ad naturam referunt.

- 201 *VICIA sativa*: leguminibus sessilibus subbinatis erectiusculis, foliis inferioribus re-
tusis, stipulis dentatis notatis, seminibus
levibus. *Smith Brit. 2. p. 769. a. -- Sp. pl. 1037. a. -- Desf. Atl. 2. p. 164 -- Savi Pis. 2. p. 191.*

Vicia vulgaris sativa. J. Bauh. hist. 2. lib. 17. pag. 310.

Genuæ in herbidis extra portam *degli Angeli*, et in collibus supra *Oreggina. Ann.*

202. *VICIA hybrida*: leguminibus sessilibus solitariis reflexis pilosis; vexillo villosa; foliolis emarginatis. *Smith. Brit. 2. p. 772 -- Sp. pl. 1037 -- Savi Pis. 2. p. 189 -- Jacq. Hort. Vind. tab. 146.*

In collibus secus aquæductum *dello Zerbino. Peren.*

203. *CYTISUS laburnum*: racemis simplicibus pendulis. *Sp. pl. 1041 -- Savi Pis. 2. p. 142.*

Engelo. Dod. Pempt. 785.

Laburnum, arbor trifolia anagyridi similis. *J. Bauh. Hist. 1. lib. XI. p. 361.*

Sub altiori jugo *de' due Fratelli* infra viam *Feritorem* versus. *Frutex.*

204. *CYTISUS sessilifolius*: racemis erectis,

calycibus bractea triplici , foliis floralibus sessilibus . *Sp. pl.* 1041 --- *Lam. ill. tab.* 618. *f.* 2.

In collibus *al Lagazzo. Frutex.*

205. *CYTISUS supinus* : floribus pedunculatis subbinatis ; foliis villosis ; caulibus decumbentibus, frutescentibus. *Syst. Veg. ed.* 14. *p.* 667 — *Jacq. Austr.* 1. *tab.* 20.

Cytisus VII. *Clus. Hist. lib.* 1. *p.* 97.

Secus aquæductum *dello Zerbino* prope duos pontes . *Frutex.*

Caules decumbentes. Folia ternata, petiolata, subtus magis hirsuta , foliolis obovatis , plica dorsali eminente. Flores suaveolentes, in longo racemo interfoliato terminali, aggregati, 1-4. Pedunculi breves , uniflori. Bractea linearis statim sub calyce. Calyx tubulosus, bilabiatus, labio superiore obtusè bilobo , inferiore integro. Corolla lutea, senio sanguinea. Vexillum patens , latum, emarginatum , striatum. Alæ, et carina subæquales , vexillo longè breviores . Carina vix puncto in fornice confluens , cæterum bipartita, connivens , suturâ ciliatâ. Legumen hirsutum.

Rami juniores , petioli, inferior foliorum pagina , pedunculi , calyces , legumina molli , et incana hirsutie præ reliquis partibus scatent.

206. *CYTISUS triflorus*: pedunculis lateralibus subternatis filiformibus, calycibus abbreviatis hirtis, foliis hirsutis. *Herit. Stirp. nov. Consp. fasc.* 7. *p.* 184.

C. triflorus : foliolis ternis , obovatis , hirtis, mucronatis ; floribus axillaribus pedicellatis ; calyce abbreviato ; leguminibus villosis

sissimis. *Desf. Atl. 2. p. 139 -- Savi Pis. 2. p. 384.*

Cytisus 3. Clus. Hist. lib. 1. p. 94.

Ad radices montis *Gneo. Frutex.*

207. *CORONILLA emerus* : fruticosa ; pedunculis subtrifloris , corollarum unguibus calyce triplo longioribus , caule angulato. *Sp. pl. 1046. a -- Savi Pis. 2. p. 200.*

Colutea scorpioides. Lugd. Hist. 1. p. 217.

In collibus *Poreiferæ al Boschetto. Frutex.*

Arbuscula humanæ altitudinis , et ultra. Folia pinnata , foliolis parvis , inferioribus adhuc minoribus. Pedunculi axillares , 1--5 , aggregati , apice umbellati. Vexillum intus prope unguem squamulâ auctum.

208. *SCORPIURUS subvillosa* : pedunculis subquadrifloris , leguminibus extrorsum spinis confertis acutis. *Sp. pl. 1050 -- Desf. Atl. 2. p. 173 -- Moris. Ox. s. 2. t. 11. fig. II. fructus.*

Genuæ sub mœniis in littore *alla Foce. Ann.*

Caules plures ex eadem radice , adscendentes , subpedales , ramosi , fere angulosi . Folia obversè lanceolata , acuta , in petiolum attenuata , integra , caulina alterna. Stipulæ acuminatæ ; margine scariosæ , ut plurimum inæquales , et integræ. Pedunculi axillares , longi , nudi , angulosi . Flores lutei , 3--4 in umbella terminali. Calyx quinquefidus. Vexillum alis , et carinâ longius , prope unguem striis rubris notatum . Alæ et carina longitudine æquales. Legumen articulatum , contortuplicatum , intus glabrum , extus echinatum spinis primùm mollibus , dein arescendo rigentibus . Tota planta leviter pubescens ,

209. HIPPOCREPIS *comosa* : leguminibus pendunculatis confertis arcuatis margine exterioriore repandis. *Smith Brit.* 2. p. 777 -- *Engl. Bot. tab.* 31 -- *Sp. pl.* 1050 -- *Jacq. Austr.* 5. tab. 431.

Ferrum equinum capitatum comosum. *Moris. Ox. s.* 2. t. 10. f. 3.

In collibus secus aquæductum dello Zerbino. *Perenn.*

210. HEDYSARUM *onobrychis* : foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. *Sp. pl.* 1059. a -- *Smith Brit.* 2. p. 778 --- *Engl. Bot.* 2. t. 96 --- *Jacq. Austr.* 4. tab. 352.

In collibus al Lagazzo. *Peren.*

Caulis adscendens. Corollæ rubro-flammæ, striis saturationibus. Vexillum emarginatum carinâ lineam circiter longius. Carina superne rectangulo -- incurva. Alæ brevissimæ, et toto calyce minores. Calyx dentibus quinque subulatis, subæqualibus, ciliato-plumosis. Bractea linearis, calyce brevior ad basim cujusvis flosculi. Spica densa, conica. Flores inferiores primores.

211. ASTRAGALUS *monspessulanus* : scapis declinatis; vexillo prælongo; leguminibus teretibus, crassis, arcuatis.

A. monspessulanus. *Sp. pl.* 1072 --- *Scop. Carn. ed.* 2. t. 2. p. 77. n. 921. tab. 45.

A. monspessulanus. *J. Bauh. hist.* 2. lib. 17. p. 338.

Genuæ in collibus al Lagazzo, et in montibus extra lo Sperone. *Peren.*

Radix lignosa; statim supra terram abit in plures surculos lignosos, breves, diffusos,

ex quorum summitate fasciculatim prodeunt scapi, et folia e sinu squamarum acuminatarum, subrubescentium, queis surculi teguntur. Folia petiolata, pinnata, cum impari, pinnis 10-20, inferioribus remotioribus. Foliola ovata, vel obtusa cum setula terminali, vel acuta, basi rotundata, petiolo partiali brevissimo suffulta, supra fuscè viridia, glabra, subtus pallidiora, et pilis adpressis conspersa. Scapi declinati, foliis paullulum longiores, supernè præcipuè angulosi. Flores dilutè purpurei, in racemo spiciformi, stricto, terminali. Bracteæ lanceolato--lineares, acuminatæ, pilosæ, pedunculis duplo longiores, calyci concolores. Calyx cylindricus, ex-viridi pulchrè rubellus, dentibus quinque longiusculis, subulatis, superioribus divaricatis. Vexillum alis, et carinâ sesquilineam longius, emarginatum. Alæ carinâ longiores, apice bidentatæ, dente altero majori, basi hinc appendiculatæ. Carina obtusa, utrinque infernè appendiculata, ungue bifido. Stamina diadelfa, simplex, et novemfidum. Antheræ croceæ. Legumen teres, crassum, leniter arcuatum, stylo persistenti, et uncato terminatum, levissimè pubescens, sæpe rubens, in majoribus speciminibus sesquipollicem longum. Tota ferè planta pilis adpressis albidis scatet.

212. TRIFOLIUM *officinale*: leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Smith Brit. 2. p. 781.*

T. melilotus officinalis *α. Sp. pl. 1078 -- Bull. Herb. de la France tab. 255.*

- T. odoratum sive melilotus. *Dod. Pempt.* 567.
 In littore *alla Foce* sub mœniis. *Ann.*
213. TRIFOLIUM *rubens* : spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis serrulatis. *Sp. pl.* 1081. — *Desf. Atl.* 2. p. 196. — *Jacq. Austr.* 4. t. 385.
 Trifolii majoris tertii altera species. *Clus. hist. lib.* VI. p. CCXLVI.
- Genuæ in collibus *al Lagazzo*. *Ann.*
- Caulis erectus, vel adscendens, teres, glaber, simplex, vel ramosus. Folia ternata, petiolata, glabra, caulina alterna, radicalia minora, et interdum pilis raris, et longiusculis ciliata. Foliola elliptico-lanceolata, obtusa, tenuissimè, et inæqualiter serrulata, supra viridia, subtus glauca, notata venis minutissimis, crebris, et ramosis, quæ a nervo medio ortæ, leniter arcu facto, in denticulos marginales designant. Petioli sulcati, superiores breviores, orti e sinu stipulæ bifidæ, amplexicaulis, elongatæ, laciniis angustis, lanceolato-acuminatis, sæpe serrulatis. Flores rubri, in densa spica terminali, cylindrica, interdum globosa. Calyx glaber, dentibus ciliato — plumosis, setaceis, inferiore cæteris triplo longiore, et corollam subæquantem. Corolla monopetala, tubo longo, limbo quadrifido, corollam papilionaceam mentiente. Bractæ nullæ.
214. TRIFOLIUM *medium* : spicis laxis, caulibus flexuosis, ramosis, corollis subæqualibus, stipulis subulato-linearibus. *Smith Brit.* 2. p. 786. — *Engl. Bot.* 3. tab. 190. — *Linn. Faun. Suec. ed.* 2. p. 558 — *Trans. of. Lin. Soc.* 1. p. 238. n. 2.

T. flexuosum . *Jacq. Austr. 4. tab. 386.*

Copiosè in summo cacumine *il Diamante*
statim sub arce Porciferam versus *Peren.*

- „ Radix obliquè descendens , infra tellurem
- „ repens , fusco-cinerascens . Caules suf-
- „ fruticosi , infernè obliqui , subtrigoni
- „ (siccati exactè trigoni), supernè erectiu-
- „ sculi teretes , geniculato -- flexuosi , ra-
- „ mosi , ramis e tumore axillari calloso ad-
- „ surgentibus , saturatè virides , interdum
- „ hic illic rubentes . Stipulæ longæ , su-
- „ bulatæ , 3-5-nerves , glabræ , ciliatæ , a
- „ caule divergentes , inter se conniven-
- „ tes , vaginantes : vaginis angustatis , su-
- „ bamplexicaulibus , margine utrinque
- „ rectis , initio villosis , dein glabris , ci-
- „ liatis . Petioli inæquales , inferiores sti-
- „ pulis multò longiores , superiores ferè
- „ breviores , omnes subdivergentes . Folio-
- „ la inæqualia , initio et infernè ovata ,
- „ dein et medio oblonga , tandem et su-
- „ pernè fere lanceolata , et sæpe subatte-
- „ nuata , foliorum infimorum multò mi-
- „ nora obtusissima et interdum retusa ,
- „ reliquorum majora et acutiora , omnia
- „ supra obsoletius , subtus evidentius ve-
- „ nosa , supra etiam lunulis binis pallidis
- „ longitudinalibus et ad apices contiguis
- „ frequenter notata , versus oras e venis
- „ concurrentibus substriata , margine villis
- „ pluribus longiusculis appressis instructa ,
- „ ad tactum vix scabra , oculis nudis integer-
- „ rima , sed armatis tenuissimè denticula-
- „ ta , præsertim in foliis superioribus . Spi-
- „ ca initio sphæroides , tandem globosa vel
- „ ovalis , solitaria vel gemina ; altera ple-

„ rumque serius florente , sessilis vel pe-
 „ dunculata, una vel utraque ; pedunculis
 „ inæqualibus , unico vel duobus foliis flo-
 „ ralibus suffulta ut plurimum dependen-
 „ tibus . Flores divergentes , laxè imbri-
 „ cati . Perianthium compressiusculum ,
 „ glabrum vel rarius pilosum , pallidum ,
 „ et sæpe hic illic purpurascens , præser-
 „ tim in spicæ vertice : striis satura-
 „ tæ viridibus , et interdum purpureis .
 „ Dentes virides , et plerumque simul qua-
 „ parte rubentes , superiores bini æquales
 „ et tubo perianthii breviores , inferiores
 „ bini etiam æquales , sed superioribus lon-
 „ giores , et tubum perianthii vel æquan-
 „ tes vel paullum excedentes , infimus
 „ longitudine tubi corollæ , sed proximis
 „ dentibus multò , non tamen duplo lon-
 „ gior . Corolla odorata : vexillo alis vix
 „ longiore submucronato , striis saturatiùs
 „ purpureis instructo ; alis pallidioribus
 „ carinâ parum longioribus . “ *Afzelius*
Trans. of. Lin. soc. l. c.

215. **TRIFOLIUM stellatum** : spicis pilosis ,
 calycibus patentibus , caule diffuso , folio-
 lis obcordatis. *Sp. pl.* 1083. — *Savi Pis.*
2. p. 153. — *Desf. Atl.* 2. *p.* 199.

Lagopus minor erectus capite globoso stella-
to flore purpureo . Barrel. ic. 860.

Trifolium stellatum purp. Moris. Ox. s. 2.
t. 13. *f.* 9.

Genuæ sub *la Lanterna* , et in mœniis pas-
 sim. *Ann.*

216. **TRIFOLIUM montanum** : spicis globosis ;
 calycibus nudis , dentibus subæqualibus ;
 foliolis lanceolatis , utrinque acutis ; cau-
 le erecto ,

T. montanum. *Sp. pl.* 1087 --- *Afzel. Trans. of Lin. Soc.* I. p. 231 --- *Pollich Palat.* 2. p. 341. exactè descr.

Genuæ *ai Camaldoli*. D. GRIOLET. *Peren.*
Flores albi. Calyx glaber, aut vix pubescens, dentibus subæqualibus. Foliola exactè lanceolata, utrinque acuta, serrulata. Caulis erectus, conspersus pilis adpressis incanis, ut inferior foliorum pagina. *Trifolium ochroleucum* ab hoc distinctum colore florum luteolo, dente calycino cæteris duplo longiore, foliolis ellipticis, obtusis.

217. *LOTUS hirsutus*: capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Sp. pl.* 1091. --- *Desf. Atl.* 2. p. 204. --- *Savj Pis.* 2. p. 145.

Trifolium album rectum hirsutum. *J. Bauh. Hist.* 2. lib. 17. p. 360.

Genuæ sub mœniis in littore *alla Foce*. *Peren.*
Corollæ vexillum roseum; alæ albidae; carina apice spadicea, nitida. Tota planta hirsuta.

218. *LOTUS corniculatus*: capitulis depressis multifloris, caulibus decumbentibus, leguminibus teretibus patentibus. *Smith Brit.* 2. p. 793. α --- *Sp. pl.* 1092. α --- *Desf. Atl.* 2. p. 205. --- *Savi Pis.* 2. p. 147.

Trifolium corniculatum. *Dod. Pempt.* 573.
In collibus Genuensibus fere ubique, etiam inter *lo Sperone*, et *i due Fratelli*. *Peren.*

219. *MEDICAGO marina*: pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Sp. pl.* 1097 --- *Desf. Atl.* 2. p. 210.
M. marina; caule humifuso tomentoso; pe-

dunculis racemoso--capitatis : leguminibus cochleatis tomentosis . *Cavanil. Ic. et Descrip.* 2. p. 26. n. 142. tab. 130.

Medica marina . *Clus. Hist. lib. vi. pag. CDXLIIJ.*

A Sestri di Ponente in littore . *Pereñ.*

220. *MEDICAGO polymorpha* & *rigidula* . *Sp. pl.* 1098.

Medica hirsuta echinis rigidioribus . *J. Bauh. Hist. 2. lib. 17. p. 385.* cum icone bene fructum referente , posita per errorem sub *Medica echinata magna hirsuta* ibi. , et exhibente ramulum fructiferum secantem prope basim figuram *Medicae echinatae magnae* ec,

Passim in littore a *Sestri di Ponente* . *Ann.*

Caules prostrati , diffusi . Foliola obcordata , basi cuneata integra , supernè serrulata , interdum subrotunda . Stipulae laciniatae . Pedunculi foliis subaequales . Flores 3--4 , lutei . Legumen cylindricum , spiris adpressis , extremitatibus planis , glabrum , echinatum aculeis longiusculis , et raris . Herba villis canescentibus pubescens.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

221. *TRAGOPOGON Dalechampii* : calycibus monophyllis , corollâ brevioribus , inermibus ; foliis runcinatis . *Sp. pl.* 1110. excl. *Barrel. syn.* — *Savi Pis.* 2. p. 211. — *Desf. Atl.* 2. p. 218.

Hieracium magnum Dalechamp. *Lugd. Hist.* I. p. 569.

Hedipnois Mōnspessulana , sive dens Leonis

Monsp. *J. Bauh. Hist.* 2. lib. 24. p. 1036.

Scorzonera italiana . *Dur. Herb. nuov. ed.*

Ven. 1718. p. 404.

Ubique in pascuis collinis , *Peren.*

222. TRAGOPOGON *picroides* : calycibus monophyllis corollā brevioribus aculeatis , foliis runcinatis denticulatis . *Sp. pl.* 1111.

Sonchus asper laciniatus Creticus . C. B. Prodr. 60. cum icon.

Genuæ inter saxa ad mare in pomario *del Principe . Ann.*

Semina incurva , utrinque muricata , apice dilatata in ampullam membranaceam vacuam , extus papillis scabram , sensim abeuntem in pappum stipitatum plumosum .

223. SCORZONERA *picroides* : foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis , inferioribus runcinatis , pedunculis squamatis . *Sp. pl.* 1114.

Crepis Dalechamp. Lugd. Hist. I. p. 561.

Sonchus picroides . All. Ped. I. p. 223. n.

819. *tab.* 16. --- *Savi Pis.* 2. p. 219.

Ubique in tota Liguria ; vulgò *Terracrepoli . Ann.*

Caulis teres , tener , subpedalis , parum ramosus . Folia polymorpha ; radicalia vel angusta , runcinata , vel obversè lanceolata , denticulata , aut subruncinata . Caulina integerrima , aut denticulata , idque nunc in toto , nunc in parte , semper infernè latiora , amplexicaulia . Rami apice uniflori , longi , nudi , aut infernè subfoliosi , adpersi squamulis cordato--acutis , margine pallentibus , sub flore crebris . Semiflosculi lutei , radiantes subtus pallidè pur-

purei . Semina rugosa . Pappus sessilis simplex . Receptaculum nudum . Tota planta glabra , et glaucescens .

224. *PICRIS echioides* : calyce exteriori pentaphyllo maximo aculeato , pappo stipitato , foliis repandis . *Smith Brit.* 2. p. 814. --- *Sp. pl.* 1114. --- *Savi Pis.* 2. p. 213.

Helmintia . *Lam. Ill. tab.* 648.

Hieracium capitulis cardui benedicti . *Moris.*

Ox. s. 7. t. 5. f. 38.

In montibus supra lo Sperone . *Ann.*

225. *PICRIS hieracioides* : calyce exteriori polyphylo abbreviato , pappo sessili , foliis undulatis ; radicalibus dentatis . *Smith Brit.* 2. p. 814. --- *Engl. Bot. t.* 196. --- *Sp. pl.* 1115 --- *Lam. Ill. tab.* 648.

Crepis hieracioides . *Savi Pis.* 2. p. 226.

Hieracium asperum . *Moris . Ox. s.* 7. t. 4. f. 45.

Ubique in agrorum marginibus . *Bien.*

226. *SONCHUS arvensis* : pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis , foliis runcinatis denticulatis basi cordatis , radice repente . *Smith. Brit.* 2. p. 817. --- *Engl. Bot. tab.* 674. --- *Sp. pl.* 1116. --- *Pollich Palat.* 2. p. 369.

In collibus cultis , hortisque Genuensibus passim cum sequente . *Peren.*

Icones hujus speciei apud antiquos Botanicos , nec Fuchsianâ exclusâ , parum bonæ.

227. *SONCHUS oleraceus* : pedunculis tomentosis , calycibus levibus , foliis runcinatis dentatis . *Smith Brit.* 2. p. 817. n. 4. --- *Sp. pl.* 1116. a *levis* --- *Desf. Atl.* 2. p. 224.

S. levis vulgaris foliis laciniosis dentis leo-

nis . *Lob. ic.* 235.

Passim in hortis Genuensibus . *Ann.*

228. *SONCHUS tenerrimus*: pedunculis tomentosis , calycibus pilosis . *Sp. pl.* 1117 --- *Savi Pis.* 2. p. 218. --- *Desf. Atl.* 2. p. 223. *Chondrilla lutea* . *J. Bauh. Hist.* 2. lib. 24. p. 1020.

Hieracium foliis in tenues lacinias profundè sectis . *Pluk. Phyt. tab.* 93. f. 3.

Genuæ in mœniis , præcipuè maritimis . *Peren.*

Folia verè polymorpha , ita ut si quis hæc videat vernalia , vel autumnalia , vix pro foliis ejusdem speciei habebit . Icones superiùs citatæ plantam vernalem indigitant ; autumno folia sunt bipinnatifida , laciniis angustissimis , irregularibus , inæqualiter denticulatis , sæpe circa nervum deficientibus . Tomentum in pedunculis non semper adest .

229. *LEONTODON taraxacum*: squamis calycinis exterioribus reflexis , foliis runcinatis dentatis glabris . *Smith. Brit.* 2. p. 822. * --- *Sp. pl.* 1122. * --- *Savi Pis.* 2. p. 222. --- *Bull. Herb. de la France tab.* 217.

Taraxacum dens leonis . *Desf. Atl.* 2. p. 228. --- *Lam. ill. tab.* 653.

β *Sp. pl.* 1122. -- *Smith. Brit.* 2. p. 822.

Dens leonis angustiore folio . *C. B. P.* 126.

Dens leonis tenuissimo folio . *C. B. Prodr.* 62. n. 2.

In viis ubique ; β in collibus supra *Oreggina* . *Peren.*

In var. β. laciniae foliorum præcipuè inferiores sunt tenuissimæ , nunc integræ nunc iterum laciniatæ . Scapus sesquipollicem vel duos pollices longus . Calyx totus ere-

otus , interdum laxiusculus , retroflexum
nondum vidi. Pappus stipitatus , simplex .
Partium tenuitate tantum ab *a* distinctum :
230. LEONTODON *tuberosum* : foliis runci-
natis scabris , calyce hirto . *Sp. pl.* 1123 --
Desf. Atl. 2. p. 229.

Hyoseris tuberosa . *Savi Pis.* 2. p. 231.

Dens leonis Monspeliensium . *Dod. Pempt.*
636.

Ubique locis herbidis . *Peren.*

Calycibus hirsutis , nigrescentibus , tuberibus
radicalibus fasciculatis , fusiformibus , in
prælongam fibrillam desinentibus citò di-
stinguitur . Semina radii coronata calycu-
lo laciniato , brevissimo , reliqua pappo
stipitato plumoso .

231. LEONTODON *hirtum* : foliis sinuatis ,
hirtis , scabris ; calycibus brevissimè caly-
culatis ; scapo filiformi.

Hieracium parvum hirtum caule aphylo cris-
pum ubi siccatum . *J. Bauh. hist.* 2. lib.
24. p. 1038.

Leontodon hirtum . *Sp. pl.* 1123.

Hedypnois hirta . *Smith Brit.* 2. p. 824.

In pascuis montium inter l' *Acqua Santa*, et
la Pena . *Peren.*

Folia cæspitem radicalem conficiunt , obver-
sè lanceolata , obtusiuscula , sinuata , hir-
ta , scabra . Scapus filiformis , nudus , fo-
liis duplo longior , apice crassiusculus ,
sæpe basi pilosus , et supernè glaber . Ca-
lyx cylindricus , calyculatus squamulis mi-
nimis , apice rubentibus , ut plurimum
glaber , interdum hirsutus . Flos luteus ,
ante anthesin nutans , semipollicaris dia-
metri . Ligulæ radii subtus viridi-purpu-

reæ . Semina rugosa , radialia coronata calyculo brevi multidentato ; reliquorum pappus plumosus , centralium breviter stipitatus .

232. LEONTODON *hispidum* γ. *Sp. pl.* 1124.
Hieracium 8. folio Hedipnoidis . *Clus. Hist. lib. V. pag. CXLIIJ.*

Frequens in montibus inter lo *Sperone*, et il *Diamante*. *Peren.*

Radix semper rectangulo—transversa , fibris lateralibus , perpendicularibus . Folia cespitem radicalem conficiunt , obversè lanceolata , sinuata , aut laxè dentata , obtusiuscula , pubescentia, vel hirsuta , pauca . Scapus crassiusculus , bracteis lineari-subulatis longiusculis hinc inde , et semper supernè adpersus , striatus , pedalis , ascendens , apice crassior , pubescens . Flos luteus , ante anthesin nutans , pollicaris diametri . Calyx cylindricus , imbricatus , foliolis nunc strictis , nunc laxiusculis , pubescentibus . Ligulæ radii subtus viridipurpurascens . Pappus sessilis , plumosus , seminibus fere duplo longior .

In nonnullis speciminibus caulis gerit unam , aut duas tantum bracteas inter se se dissitas, in aliis plures. Sarzanæ hæc ipsa species est valdè frequens in pratis nunc pubescens , nunc tota glaberrima : ubi glabra eadem est procul dubio ac *Leontodon hastile* *Jacq. Austr. 2. p. 41. tab. 164.*

233. HYERACIUM *sylvaticum* : caule paniculato folioso, foliis radicalibus ovatis utrinque acutis subdentatis . *Smith Brit. 2. p. 831 --- Savi Pis. 2. p. 225.*

H. murorum. *All. Ped. 1. p. 215. tab. 28. f. 1. Smith.*

Pilosellæ majoris s. pulmonariæ luteæ species angustifolia. J. Bauh. hist. 2. lib. 24. p. 1034.

In collibus *di Pegli. Peren.*

234. *CREPIS foetida* : foliis runcinato--pinna-
tifidis hirtis , petiolis dentatis , caule pilo-
so , calyce tomentoso . *Smith Brit. 2. p. 837. n. 1--Eng. Bot. tab. 406--Sp. pl. 1133.*

Picris foetida. Savi Pis. 2. p. 214.

Erigeron tertium. Dod. Pempt. 641.

Sub lo Sperone intus mœnia. Bien.

Folia inter digitos contrita dant verum odo-
rem amygdalæ amaræ. Pappus penicilli ad-
instar longe porrigitur extra calycem. Plan-
ta incano villo pubescens.

235. *CREPIS præcox* : foliis runcinato--pinna-
tifidis , denticulatis , pubescentibus ; caule,
calyceque interiori setis nigris hirtis ; flo-
ribus corymbosis.

C. præcox. Balb. Miscel. Bot. p. 37. tab. 9.

Nil frequentius in omnibus collibus Genuen-
sibus. Floret Aprili , Maio .

Foliorum habitus, ut in pluribus *Crepidibus*.

Caulis erectus , angulosus , sulcatus , usque
ad tres pedes altus , ramosus , pubescens ,
et insuper hinc inde adpersus setis brevi-
bus , nigris , rigescentibus , unde murica-
to--scaber , infernè sæpe rubens. Flores co-
rymbosi lutei. Calyx exterior latus , inte-
riore dimidio brevior , foliolis linearibus ,
pubescentibus , margine pallidioribus. Ca-
lyx interior erectus , pubescens , setisque
brevibus nigris , demum rigescentibus lon-
gitudinaliter hirtus . Semina apice subu-
lata , attenuata in stipitem. Pappus oculis
nudis simplex .

Facies omnino *Crepidis biennis* Engl. Bot. tab. 149., sed minor.

236. HYOSERIS *radiata* : scapis unifloris nudis ; foliis glabris runcinatis , angulis dentatis. *Sp. pl.* 1137 -- *Savi Pis.* 2. p. 230. Dens leonis minor, foliis radiatis. *Pluk. Phyt.* tab. 37. f. 2.

Taraxacon saxatile. *Bocc. Mus.* tab. 106.

Genuæ in muris , et locis herbidis. *Peren.*

Questa pianta cresce in molta abbondanza in Genova sunt ipsissima verba *Bocconi Mus.* p. 147. , hinc nullum dubium de identitate stirpis , cum Genuæ non oriatur alia species *Bocconianae* respondens.

237. HYOSERIS *rhagadioloides*: squamis calycinis carinâ ciliatis , caule ramoso.

H. rhagadioloides. *Sp. pl.* 1139.

A Sestri di Ponente in littoris initio Genuam versus. *Ann.*

Folia radicalia sinuata , vel profundè dentata dentibus sursum versis , apice paullulum latiora , subtridentata , sessilia , pilosa , scabra . Caules plures ex eadem radice , prostrati , ramosi , divaricati , angulosi , vix pilosi , et fere glabri , ad divisiones instructi folio lanceolato , acuminato , dentato , sessili , piloso , radicalibus minore. Rami apice incrassati , uniflori , sæpe unâ alterâve bracteolâ , vel foliolo ciliato adpersi. Calyx floris cylindricus , parvis , et inæqualibus squamulis calyculatus . Foliola calycina omnia carinâ ciliis rigidulis veluti serrulata præcipuè ad apicem , cæterum glaberrima. Calyx fructus globoso-turbinatus. Flos luteus parvus , vix semipollicaris diametri , ligulæ 5-dentatæ radiales subtus ru-

bello--purpureæ . Semina incurva , radialia
foventur a foliolis calycinis , omnia caly-
culo dentato-lacero coronata , centralia non-
nulla præter hunc calyculum gerunt pap-
pum sessilem , simplicem , ex paucis setis,
rarò ultra quinque. Interdum unum alte-
rumve ex reliquis seminibus unam alteram-
ve setam unà cum calyculo gerit. Semina
arctè receptaculo adfixa. Receptaculum nu-
dum.

Hyoseris hedypnois habet calyces glabros ,
H. Cretica undique pilosos , utraque folia
minus laciniata.

238. *SERIOLA aethnensis* : hirsuta , foliis obo-
vatis subdentatis.

S. aethnensis . *Sp.pl.* 1139.

S. urens . *All. Ped.* 1. p. 230. n. 851. *tab.*
29. *fig.* 1.

Seriola . *Lam. ill. tab.* 656. *f.* 1.

Communis *al Lagazzo. Ann.*

Folia radicalia obovata , plus minus obtusa ;
in longum , et angustum petiolum attenuata ,
rarè dentata , hirsuta . Caulis teres , erectus ,
pilosus , vel hirsutus , a semipede ad pedem
longus , simplex , vel ramosus , instructus
ad divisionem foliis successivè minoribus ,
ita ut superiora sint ramenta linearia .
Calyx cylindricus , hirsutus , lactescens ,
simplex , foliolis linearibus æqualibus. Flo-
res lutei , radiales subtus flammeo--rubri.
Ligulæ 5--dentatæ. Semina radii basi con-
nata cum foliolis calycinis , a quibus am-
plexantur , pro pappo calyculo brevissimo
membranaceo coronata. Reliqua semina pap-
po stipitato , et plumoso donantur. Squama
linearis , foliolis calycinis subæqualis , in

subulatum, et prælongum acumen desinens
distinguit unumquemque flosculum, et cum
seminibus diffluit. Receptaculum planum.

239. HYPOCHAERIS *maculata* : caule solita-
rio nudiusculo subsimplici, foliis ovato-
oblongis integris dentatis. *Smith Brit.* 2.
p. 840 --- *Sp. pl.* 1140 -- *Alli. Ped.* 1. *p.*
230. *n.* 849. *tab.* 14. *f.* 3.

Hypochæris. *n.* 2. *Hall. Hist. Stirp. Indig.*
Helv. t. 1. *p.* 2. *tab.* 1.

In montibus sub *lo Sperone. Peren.*

240. CATANANCHE *coerulea* : squamis caly-
cinis inferioribus ovatis. *Sp. pl.* 1142 ---
Desf. Atl. 2. *p.* 239.

Condriillæ species tertia. *Dod. Pempt.* 638.

Condrilla cyanoides cœrulea coronopifol. *Bar-
rel. ic.* 1134.

In collibus *al Lagazzo. Peren.*

Folia radicalia lanceolata, angusta, prelonga,
trinervia, prope medium utrinque instru-
cta uno alterove dente, vel laciniâ, caulina
minora, sæpius integerrima; omnia pube-
scentia. Caulis striatus, erectus, duos vel
tres pedes longus, ramosus. Pedunculi præ-
longi, supernè adpersi bracteis scariosis,
squamas calycinas referentibus, licèt, mi-
noribus, supremis crebrioribus. Flores so-
litarii terminales, pulchrè cœrulei, sesqui-
pollicaris diametri, et ultra. Calyx ovatus
constans squamis ovatis, aristulâ termina-
tis, concavis, laxè imbricatis, albo-sca-
riosis, pellucidis, nervo dorsali fusco di-
remptis, quarum inferiores sunt sessiles,
reliquæ oriuntur ex apice foliolorum viri-
dium, margine fuscescentium, successivè
longiorum. Semiflosculi 4-5-dentati, ad fau-

cem extus villosi. Antheræ atro--purpureæ; pollen luteum. Stigma longè exertum, bifidum. Semina villosa, apice coronata paleis quinque sessilibus, ovato--lanceolatis, aliis muticis, aliis breviter aristatis, albo--scariosis, pellucidis ad instar squamarum calycis. Receptaculum longis, albidisquæ setis adpersum.

241. SCOLYMUS *maculatus*: caule infernè ramoso; floribus solitariis, congestisve.

Scolymus Theophrasti Narbonensis. *Clus.*

Hist. lib. v. p. CLIIJ.

Spina lutea. *J. Bauh. Hist. 3. lib. 25. p. 48.*

Scolymus chrysanthemus perennis lactescens, albis maculis notatus. *Moris. Ox. s. 7. t. 35.*

S. hispanicus. Savi Pis. 2. p. 237.

S. maculatus. Sp. pl. 1143?

Genuæ ubique in viis, glareis, littoribus:

Perenn.

Radix perennis. Caulis teres, infernè tantùm ramosus, usque ad duos pedes longus, erectus, vel decumbens, annuus. Folia sinuata, dentato--aculeata, acuminata, undulata, albis maculis reticulata, pubescentia, interdum, nec semper, scabra, nunc marginibus incrassata, nunc attenuata; radicalia petiolata, caulina sessilia, minora, decurrentia, sed non usque ad subjectum folium, alis dentato-spinosis. Spinæ rigidæ, albæ, a plantæ attactu arcentes. Flores solitarij, axillares, sessiles, aurei; sæpe in foliorum axillis ramulus brevissimus adest, onustus tribus, quatuorve floribus approximatis, congestis, singulis foliolo interstinctis. Ligulæ apice tenuissimè quinquedentatæ, staminibus valdè longiores. Stamina,

et stigmata aurea ut ligulae. Semina radii clausa veluti in folliculo intra suprema foliola calycina; semina disci contenta in folliculo membranaceo, ovato, compresso, glabro, margine albo--scarioso, medio viridi. Omnium seminum pappus constat paucis setis, sessilibus, ad lentem villis, levissima de causa deciduis. Receptaculum nudum, nisi pro paleis habeantur folliculi semina claudentes. Planta vulnerata fundit lac album viscosum.

Caulis quotannis perit. Radix perennat, foliaque radicalia, exeunte fere autumno, emittit in hyemem duratura, quod jam rectè observavit *Morisonus*. Magna confusio apud auctores fere omnes circa *Scolymum maculatum*, et *Hispanicum* *Linn.*, speciesque a me descripta apud plerosque *Scolymus hispanicus* audit. Quidquid sit, icones superius citatae meam indignant plantam, et si alia est a *Scolymo maculato* *Sp. pl.*, malè *Linnaeus* *Scolymum Theophrasti Narbonensem* *Clusii* eidem retulit.

242. **CARDUUS lanceolatus**: foliis decurrentibus, pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis villosis, caule piloso. *Sp. pl.* 1149. -- *Smith Brit.* 2. p. 847. -- *Engl. Bot.* 2. t. 107. -- *Pollich. Palat.* 2. p. 414.

C. spinosissimus. *Gerbi Stor. d' un nuovo insetto cum ic.*

C. vulgaris. *Savi Pis.* 2. p. 241.

Secus Leira. *Bien.*

243. **CARDUUS pycnocephalus**: foliis decurrentibus pinnatifido-sinuatis pubescentibus spinosis, pedunculis nudis tomentosis, ca-

lycibus deciduis . *Sp. pl.* 1151 --- *Savi Pis.* 2. p. 240. --- *Jacq. Hort. Vind.* I. tab. 44.

Ubique in viis campestribus Genuæ . *Peren.*
Vulgaris in Liguria planta ; humido solo luxurians , caule crassiori , alis latioribus , flosculisque numerosioribus , omnino ut in *C. tenuifloro Engl. Bot. tab.* 412. ; in apri-
cò verò macrior , caule tenuiori , alis perangustis , flosculis paucioribus , ut in icono *Jacquini* . Flores primùm sessiles , congesti , dein pedunculati , pedunculis incano-tomentosis , sub flore nudis , nec alatis . Calyces maturi decidunt . Hinc *C. tenuiflorus Engl. Bot.* , et *Fl. Brit.* vix meo iudicio differt ab hoc floribus sessilibus , et calycibus non deciduis .

244. *CARDUUS arvensis* : foliis sessilibus pinatifidis spinosis , caule paniculato , calycibus ovatis spinulosis , pappo plumoso . *Smith Brit.* 2. p. 851. --- *Savi Pis.* 2. p. 243.

Serratula arvensis . *Sp. pl.* 1149. --- *Pollich Palat.* 2. p. 412.

In altiori monte de' due Fratelli . *Peren.*

245. *CARDUUS acaulis* : acaulis , calyce glabro . *Sp. pl.* 1156. --- *Smith Brit.* 2. p. 855. --- *Engl. Bot.* 3. tab. 161.

Carlina minor purpureo flore . *Clus. Hist. lib.* V. pag. CLVJ.

Chamæleon exiguus Tragi . *J. Bauh. Hist.* 3. lib. 25. p. 62.

Frequens inter lo Sperone , et il Diamante . *Peren.*

In nostris montibus nunc omnino acaulis , nunc caule digitali gaudet . Flos modò so-

litarius , modò duo vel tres congesti :
Pappus sessilis plumosus.

246. *CARLINA caulescens* : caule unifloro flore majore , foliis longis angustis pinnatis utrinque viridibus , pinnis inciso-dentatis.
Enc. -- Fl. Franc. 2. n. 15. III.

Chamæleon niger alter Matth. *Lug. Hist. 2. p. 1454.*

Crocodilium carlina caulem habens . *Lugd. Hist. 2. p. 1476.*

Carlina elatior , *chamæleon alb.* vulg. *Clus. Hist. lib. V. pag. CLV.*

Alla Guardia , et in montibus supra l' *Acqua Santa.*

247. *CARLINA vulgaris* : caulè multifloro corymboso , floribus terminalibus , squamis calycinis exterioribus pinnatifidis ; interioribus albidis . *Smith. Brit. 2. p. 857. --- Sp. pl. 1161. --- Savi Pis. 2. p. 247.*

Carlina sylvestris quibusdam , aliis *atractilis*.
J. Bauh. Hist. 3. lib. 26. p. 81. bene .

Sub arce il Diamante . Bien.

Radius ex-albo-pallidissimè -- stramineus .

248. *EUPATORIUM cannabinum* : foliis digitatis . *Sp. pl. 1173. --- Smith Brit. 2. p. 860. -- Engl. Bot. tab. 428. --- Savi Pis. 2. p. 252.*

Vulgare enpatorium . Dod. Pempt. 28.

Secus Leira . Peren .

249. *STÆHELINA dubia* : foliis linearibus denticulatis , squamis calycinis lanceolatis , pappo calycibus duplo longiore . *Sp. pl. 1176. --- Ger. Gallopr. p. 190. n. 1. tab. 6.*

Chamæchrysocome prælongis purpurascentibusque jaceæ capitulis . Barrel. ic. 406.

Serratula . Lam. ill. tab. 666. f. 4.

In collibus di Pegli ; al Gazo D. VIVIANI . Frut.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA .

250. ERIGERON *viscosum* : pedunculis unifloris lateralibus , foliis lanceolatis denticulatis , calycibus squarrosis , corollis radiatis . *Sp. pl.* 1209. --- *Jacq. Hort. Vind.* 2. tab. 165.

Solidago viscosa . *Savi Pis.* 2. p. 279.

Conyza capitata seu *globosa* . *Bocc. Sic. p.* 13. et 14. tab. 7.

Genuæ in mœniis *alla Cava* , tum in muris campestribus passim . *Peren.*

Antheræ infernè appendiculatæ ut in *Inulis* .

251. SENECIO *vulgaris* : floribus radio destitutis sparsis , foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus dentatis . *Smith Brit.* 2. p. 881 --- *Sp. pl.* 1216. --- *Savi Pis.* 2. p. 285 --- *Bull. Herb. de la France* tab. 197.

Ubique . Floret præcipuè hyeme . *Ann.*

252. ASTER *acris* : foliis lanceolato-linearibus , integris , obliquatis ; floribus corymboso-fastigiatis , pedunculis foliosis .

A. acris . *Sp. pl.* 1228. --- *Cavanil. Ic. et Descr.* 3. p. 17. n. 255. t. 233.

Aster angustifolius tripolii flore . *Barrel. ic.* 606.

Sub *il Diamante* . *Ann.*

Caulis erectus , striatus , a palmo ad tres pedes longus , leviter pubescens . Folia crebra , sparsa , lineari-lanceolata , acuta , integra , obliqua , punctata , trinervia , nervis lateralibus obsoletis , glabra , vel pubescentia . In eorum axillis sæpe ramorum rudi-

menta foliorum fasciculum mentientia reperiuntur. Flores in corymbo fastigiato terminali. Pedunculi sæpe ramosi, adspersi foliolis, sive bracteis linearibus. Calyx cylindricus, foliolis linearibus, imbricatis, strictis. Semiflosculi radii pallidè cœruleo-purpurei. Flosculi disci primùm lutei, dein senescendo purpurei. Semina pubescentia. Pappus sessilis, simplex, inæqualis. Receptaculum planum nudum.

253. *SOLIDAGO virgaurea*: caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Sp. pl.* 1235. — *Smith Brit.* 2. p. 889. — *Engl. Bot. tab.* 301.

Virga aurea margine crenato. *Dod. Pempt.* 142.

In montibus supra *lo Sperone*. *Peren.*

254. *INULA dysenterica*: foliis amplexicaulibus cordato-oblongis tomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis hirtis. *Smith Brit.* 2. p. 891. — *Sp. pl.* 1237 — *Savi Pis.* 2. p. 277 — *Bull. Herb. de la France tab.* 299.

Genuæ secus aquæductum extra portam *dello Zerbino*. *Peren.*

255. *INULA spiræifolia*: foliis sessilibus, ovato-oblongis, crebrè serrulatis, corymbis strictissimis.

I. spiræifolia. *Sp. pl.* 1238.

Conyzæ Monspeliensi affinis multiflora. *J. Bauh. Hist.* 2. lib. 26. p. 1049. rudis.

Frequens in collibus supra *Oreggina* usque *al Diamante*. *Peren.*

Caulis simplex, striatus, erectus, etiam bipedalis, supernè unà cum foliis glaber, infernè unà cum foliis pilosus. Flores lu-

tei parvi , septem octo linearum diametri in corymbo strictissimo , et exactè fastigiatto , terminali . Pedunculi breves , foliosi . Calyx cylindricus , squamis imbricatis , squarrosis . Herba inodora .

Flores saltem tres in corymbo , passim plures , adeo approximati , ut radiis sibi invicem incumbant . Corymbus simillimus illi *Inulae Germanicae Jacq. Austr. 2. p. 21. tab. 134.* Folia in nostra sunt conferta , et crebrè denticulata , nec dissitata , ferè integra, sive raris minimisque denticulis instructa ut in planta *Jacquini* .

256. *INULA hirta . Enc. 3 -- Jacq. Austr. 4. tab. 358.*

Aster hirtus . Scop. Carn. 2. p. 173. n. 1082. tab. 58.

In collibus *al Lagazzo* usque *al Diamante . Peren.*

Caulis constanter uniflorus .

257. *CINERARIA maritima* : floribus paniculatis , foliis pinnatifidis tomentosis : laciniis sinuatis , caule frutescente . *Sp. pl. 1244.*

Jacoea marina sive cineraria . *J. Bauh. Hist. 2. lib. 24. pag. 1058.*

Jacobaea maritima sive cineraria latifolia . *Morris . Ox . s. 7. tab. 18. fig. 7.*

Genuæ in mœniis sub *la Lanterna* ; totius Liguriæ incola , locis humilioribus ad mare . *Frutex .*

Pulcherrima species ob tomentum niveum , quo folia subtus , et totus caulis teguntur .

258. *BELLIS perennis* : scapo nudo , radice repente . *Smith Brit. 2. p. 897 -- Engl.*

*Bot. tab. 424. a— Sp. pl. 1248. — Savi
Pis. 2. p. 272.*

Bellis sylvestris. Dod. Pempt. 265.

Ubique. Peren.

Variat scapis prælongis, et brevissimis.

259. *CHRISANTHEMUM achilleae*: foliis bipinnatis: pinnis imbricatis, caule stricto multifloro. *Mur. Syst. veget. edit. 14. p. 772.*

Matricaria corymbosa. Savi Pis. 2. p. 270.

*Parthenium. Mich. N. P. G. tab. 29. Herb.
Mich. D. SAVI.*

Tanacetum inodorum tenuifolium magno Bellidis flore. Barrel. ic. 785.

Sub lo Sperone intus mœnia. Peren.

Caulis striatus, erectus, simplex, 1-4-pedalis, leviter pubescens. Folia bipinnata, subtus incano-pubescentia, supra glabra et viridia, ima petiolata. Pinnæ primariæ infernè remotiores, supernè ramentis foliaceis interstinctæ. Foliola argutè inciso-dentata, leviter decurrentia. Petioli incano-pubescentes. Flores parvi, 6-8-linearum diametri, in corymbo terminali. Pedunculi simplices, ramosique, nudi, vel una, alterave bracteola lineari adpersi. Calyx hemisphæricus, foliolis lanceolatis, arctè imbricatis, obtusiusculis, viridibus, margine, et præcipuè apice scarioso-albidis, vel ferrugineis. Ligulæ radii albæ, tridentatæ. Flosculi disci lutei. Semina brevi margine crenato coronata. Receptaculum nudum.

260. *ACHILLEA millefolium*: foliis lanceolatis, bipinnatifidis pilosis: laciniis linearibus dentatis mucronatis, caulibus sulcatis.

A. millefolium. Smith Brit. 2. p. 908 —

Sp. pl. 1267. --- *Savi Pis.* 2. p. 264. ---
Bull. Herb. de la France t. 163. optima.

β. *Sp. pl.* 1267 --- *Bull. l. c.* fig. A.

Prope l' *Acqua-Santa* locis humidis , Ge-
nuæ extra mœnia *allo Sperone* . *Peren.*

In montibus siccis, veluti in illis *dello Spe-
rone*, habitum tenuiorem hirsutiorem adi-
piscitur hæc species , ut alia prorsus videat-
ur , eamque refert *Tanacetum minus albo
millefolii flore odor.* *Barrel. ic.* 992.

β. Florum colore rubro-purpureo tantum di-
stincta .

261. *ACHILLEA Ligustica* : foliis ovatis , in-
ferioribus bipinnatifidis , summis pinnatifi-
dis , laciniis integris , dentatisque ; caule
ramoso .

A. ligustica . *All. Ped.* I. p. 181. n. 660. *tab.*

53. *f.* 2. ex specim. a *CL. BALBIS* commu-
nicatis .

Frequens secus *Leira* . *Peren.*

Caulis striatus , erectus , plusquam cubita-
lis , densè foliosus, ramosus. Folia circum-
scriptione ovata , brevia , sesquipollicem
circiter longa , crebra, inferiora bipinnatifi-
da , suprema pinnatifida , foliolis lineari-
bus integris dentatisque , ima petiolata .
Corymbi terminales . Flores albi , ligulis
radii subtridentatis . Planta intensè odora ,
præcipuè distincta ab *A. millefolio* foliis
brevibus , creberrimis , circumscriptione
ovatis , odore forti , caule ramoso .

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA.

262. *CENTAUREA montana* : calycibus serratis ; fo-
liis lanceolatis, integris, sinuatisve, decurren-
tibus ; caule simplicissimo .

C. montana *Sp. pl.* 1289. *a* -- *All. Ped.* 1. p. 158. n. 578. -- *Jacq. Austr.* 4. t. 371.

C. Triumphetti . *All. Ped.* 1. p. 158. n. 579.

Cyanus major. *Dod. Pempt.* 251. -- *Lugd. Hist.* 1. p. 437.

Ciano con foglie intiere alpino , e caule alato . *Zann. ed. Mon. t.* 60.

Ciano con foglie dentate alpino . *Zann. tab.* 61.

Cyanus montanus medius caule folioso seu multifolius *Barrel. ic.* 389.

Cyanus montanus caule folioso . *Bocc. Mus. tab.* 2.

Cyanus major alpinus incisus foliis . *Triumf. Obs. pag.* 26. cum ic.

In montibus dello Sperone, et Due Fratelli . *Peren.*

Passim apud nos ludit hæc species foliis integris, vel sinuatis, calycisque ciliis albis, vel nigris, nec ullo pacto pro distinctis stirpibus habendæ sunt *C. montana*, et *C. Triumphetti* . *All.*

263. *CENTAURÆA paniculata* : calycibus ciliatis : squamis planis , foliis bipinnatifidis , rameis pinnatifidis linearibus , caule paniculato . *Sp. pl.* 1289. --- *Jacq. Austr.* 4. *tab.* 320.

β. calycibus subnudis , foliis tenuioribus.

In collibus supra Oreggina , al Castellaccio . β In montibus supra l' Acqua Santa ; tum inter Framura et Levanto in orientali plaga Liguriæ . *Peren.*

Varietas β. habet folia tenuiora, magisque canescentia, et squamas calycis subnudas, nec ciliatas ; inveniuntur tamen plantæ intermediæ, quæ sensim sensimque speciem præmonstrant .

264. *CENTAUREA scabiosa* : squamis calycinis ciliatis ovatis , foliis pinnatifidis : laciniis lanceolatis subdentatis pilosiusculis .
Smith. Brit. 2. p. 911. -- Engl. Bot. tab. 56. -- Sp. pl. 1291.

In montibus dello Sperone . D. GRIOLET.
Peren.

265. *CENTAUREA bracteata* : foliolis calycinis amplâ squamâ scarioso-elastica terminatis ; foliis radicalibus integris , incisive , serrulatis , caulinis linearibus integerrimis ; seminibus nudis .

C. amara . Sp. pl. 1292 ?

C. bracteata . Soc. Med. d' Emul. di Gen. tom. 2. prim. quadr. pag. 143.

In collibus Genuensibus ubique . *Peren.*

Folia inferiora lanceolata , aut ovata acuminata , leviter argutèque serrata , in petiolum attenuata , radicalia interdum basi sinuata , sæpe trifida , laciniâ media amplâ , lateralibus parvis , acutis , sursum versis . Folia superiora linearia , integerrima . Caulis decumbens , vel erectus , angulosus , ramosus , circiter bipedalis . Flores solitarii , terminales , radiantes . Plura foliola linearia , bractearum more calycem ut plurimum cingunt . Calyx ovatus , constans foliolis oblongis , viridibus , integris , margine albidis , apice terminatis amplâ squamâ scariosâ , elasticâ , albidâ , vel pallidè ferrugineâ , ovato-concavâ , eroso-crenatâ , nec ciliata , et in superioribus sæpe bifida . Flosculi quinquefidi , carnei ; radiales neutri , laciniisque exterioribus majoribus . Semina nuda , pubescentia , ante maturitatem alba , dein ex-albo-purpureoque stria-

ta . Receptaculum longis , albisque setis adpersum . Tota planta flocculis incanis , rarisque subtomentosa , præcipuè si orta in aprico . Herba in solo humenti magis amara quàm in sicco .

266. CENTAUREA *aspera* : calycibus squamis palmato-quinquespinosis , foliis lanceolatis dentatis , sinuatisve .

C. *aspera* . Sp. pl. 1296.

Jacea supina maritima laciniata , capite spinoso , flore rubello . Bocc. Mus. tab. 26.

Genuæ *al Lazaretto* , ubi suam collegerat Boccone . Ann.

GYNANDRIA DIANDRIA

267. ORCHIS *papilionacea* : bulbis indivisis , nectarium labio indiviso ampliato emarginato crenato : cornu subulato , petalis conniventibus . Sp. pl. 1331. -- Desf. Atl. 2. p. 316. -- Enc. 4. p. 594.

Orchis rubra . Allio . Auct. ad Fl. Ped. pag. 31.

Genuæ in collibus *ai Camaldoli* . D. GRIOLET . Peren.

Labium nunc latius quàm longius , nunc e contra . Flos modò ruber et fere lateritius , modò colore florum *Amygdali persicae* .

Orchidem rubram Jacq. jure merito ad *papilionaceam* revocavit Dryander in *Transactionibus Linnaeanae Societatis* .

268. ORCHIS *morio* : bulbis indivisis , nectarium labio quadrifido crenulato : cornu obtuso , petalis omnibus conniventibus . Sp. pl. 1333. -- Savi Pis. 2. p. 298.

Orchis n. 1282. *Hall. Hist. stirp. Indig. Helv. tom. 2. p. 143. tab. 33.*

In collibus supra *Oreggina*, *Lagazzo* &c. *Peren.*

Variat flore violaceo, carneo, et albo. Pulcherrimus est flos petalis, et operculis albis, viridique striatis; labio albo vel pallidissimè carneo, punctis intensè rubellis pectore variegatus.

269. ORCHIS *ustulata*: bulbis indivisis, nectararii labio quadrifido, punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Sp. pl. 1333---Engl. Bot. tab. 18.*

Orchis. n. 1273. *Hall. Hist. Stirp. indig. Helv. t. 2. p. 138. tab. 28.*

In collibus *al Lagazzo*. *Peren.*

270. ORCHIS *variegata*: bulbis indivisis; nectararii labio serrulato, variegato, tripartito, segmento medio bilobo; petalis cucullatis; spica globosa.

O. *variegata*. *Allio. Ped. 2. p. 147. n. 1828---Vitm. Sum. Plant. 5. p. 219.*

O. *tridentata*. *Scop. Carn. 2. p. 190. n. 1109---Vitm. Sum. Plant. 5. p. 220.*

Orchis. n. 1275. *Hall. Hist. Stirp. Indig. Helv. t. 2. p. 139. tab. 30.*

Ubique in collibus circa *Genuam*. *Peren.*

Radix bulbi duo subrotundi cum fibris superimpositis. Scapus teres, striatus, erectus, semipedem vel pedem longus, basi vaginatus. Folia lanceolata, striata, inferiora obtusa, superiora acuta, minora. Flores parvi, suaveolentes, (odore fere *Cheiranti Cheiri*), in spica densa, globosa, terminali. Petala infernè conglutinata, apicibus liberis, conniventia in galeam, sive cucul-

lum supra machinulam genitalem . Opercula linearia, petalis subposita , et breviora. Hæc pars floris tota pallidè carnea , intus striis longitudinalibus intensè rubellis picta . Labium planum , tripartitum , segmento medio exporrecto , bilobo cum acuminulo inter lobos , serrulatum, pallidè carneum, maculisque saturatè rubellis pulcherrimè variegatum. Labii segmenta apice latiora, lateralia angusta . Nectarium rectum , germine brevius , subcompressum, apice interdum bilobum. Machinula genitales obtusa , infernè albida , supernè sanguinea. Antheræ cinereæ. Germen angulosum, intortum. Bracteæ lanceolatae , acuminatae , carneæ , germini subæquales.

271. ORCHIS *pallens* β : labio trilobo subcrenato , maculis rubellis pectore adperso, lobo medio emarginato , lateralibus angustiore.

Orchis pallens. Savi Pis. 2. p. 300.

In collibus *al Lagazzo* , et secus acquæductum *dello Zerbino* prope duos pontes. *Peren.*

Radix bulbi duo subrotundi cum fibris superimpositis . Folia maculata. Flores in spica laxa , inodori , albidii, vel pallidissimè luteoli , labio sulphureo , maculisque rubris pectore adperso , subcrenato , trifido , segmento medio angustiore , emarginato , aut nihil , aut vix ultra lateralia exporrecto . Nectarium adscendens , longum . Statura plantæ fere ut *Orchidis morionis*.

In *Orchide pallenti Jacq. Austr. 1. p. 28. tab. 45* , cujus varietatem hanc meam facio , flores sambucum fortiter olent , maculæ rubræ in pectore labii nullæ, labium integrum , nec subcrenatum , lobo medio

lateralibus duplo latiore , et valdè expor-
recto .

272. ORCHIS *sambucina* : bulbis subpalmatis
rectis , nectarii cornu conico , labio ovato
subtrilobo , bracteis longitudine florum. *Sp.*
pl. 1334 -- *Jacq. Austr.* 2. *tab.* 108.

In collibus extra portam *di Granajuolo* . D.
VINCENT. *Peren.*

Radix sæpe bulbo altero palmato , altero ova-
to . Flores inodori , densè spicati , luteoli ,
labio inferiore saturatiore , nunc punctis
rubris adperso , nec semper , ut iam mo-
nuit etiam *Jacquinus l. c.* Petala patentia.
Opercula petalis latiora , conniventia super
machinulam genitalem . Labium semicircu-
lare , subcrenatum , crispulum , integrum ,
vel subtrilobum , lobo medio parvo , acu-
tiusculo . Nectarium dependens , crassum ,
conicum , rictu amplo . Stigma valdè obtu-
sum . Domunculæ staminum rubellæ . Bra-
cteæ lanceolatae , acutæ , virentes , germi-
ne longiores , et floribus subæquales ,
adscendentes .

273. ORCHIS *conopsea* : bulbis palmatis , ne-
ctarii cornu setaceo germinibus longiore :
labio trifido ; petalis duobus patentissimis.
Sp. pl. 1335 -- *Engl. Bot. tab.* 10.

Orchis n. 1287. *Hall. Hist. Stirp. Indig.*
Helv. 2. *p.* 147. *tab.* 29.

In collibus *al Lagazzo* .

274. OPHRIS *spiralis* : bulbis aggregatis oblon-
gis , caule subfolioso , floribus secundis ,
nectarii labio indiviso crenato . *Sp. pl.*
1340. 2.

Epipactis n. 1294. var. 1. *Hall. Hist. Stirp.*
indig. Helv. 2. *p.* 152. *tab.* 38.

Testiculus odoratus minor. *Dod. Pempt.* 239.

In collibus a Pegli Peren.

275. OPHRIS *antropophora*: bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio lineari tripartito: medio elongato, bifido. *Sp. pl.* 1343 — *Engl. Bot. tab.* 29.

Orchis. n. 1264. *Hall. Hist. Stirp. indig. Helv.* 2. p. 133. *tab.* 23.

In collibus ai Camaldoli. Peren.

276. OPHRIS *apifera*: bulbis subrotundis; scapo folioso; labio convexo, trilobo, lobis lateralibus triquetris, verticalibus, medio emarginato; appendicula terminali deorsum flexa.

O. *apifera*: *Engl. Bot. tab.* 383.

O. *arachnites* &. *Savi Pis.* 2. p. 303.

In collibus allo Zerbino. Peren.

Radix bulbi duo subrotundi cum fibris superimpositis. Scapus teres, erectus, pedem sesquipedem longus, infernè vaginatus. Folia lanceolata, acuta, striata, vaginantia, superiora minora. Flores ampli, alterni, in spica rara, terminali. Petala in triangulum patentia, elliptico-oblonga, obtusa, concava, rosea, nervis dorsalibus, 1-3, viridibus, lateralibus obsoletis. Opercula petalis longè breviora, viridia, enervia, hinc pubescentia, marginibus revolutis. Labium convexum, trilobum, lobis lateralibus triquetris, verticalibus, convexis, medio emarginato cum appendicula terminali, linearis, elongata, deorsum flexa; cæterum labium extus holosericeum, fuscum, macula pectorali glabra, parabolica, periferiis luteolis concentricis circumdata, quarum exterior biloba. Machinula genitalis refert avi-

culæ caput, rostro, sive stigmatē longiusculo, flexuoso. Stamina lutea; filamenta orta e tuberculo. Germen sulcatum. Bracteæ lanceolatae, acutæ, striatæ, canaliculatæ, virides, germini subæquales.

Nil pulchrius citata icone *Engl. Bot.*, sed stigma nec flexuosum, nec sat longum exhibetur.

277. *OPHRIS adrachnites*: bulbis subrotundis; scapo folioso; labio convexo, utrinque extuberante; lobo medio emarginato; appendicula terminali, sursum inflexa.

O. insectifera adrachnites n. *Sp. pl.* 1343.

Orchis n. 1266. *Hall. Hist. Stirp. Indig. Helv.* 2. p. 134. tab. 24. fig. 1. 2. 3.

In collibus al *Lagazzo. Peren.*

Petala albida, vel rosea, non adeo ampla ut in antecedenti. Opercula glabra, colore petalorum, paullulum longiora quam in *O. apifera*. Labium convexum, instructum utrinque protuberantiâ conicâ, extus holosericeâ, interiore latere glabrâ, luteolâ; cæterum labium emarginatum, appendicula sursum inflexa, apice latiuscula, crenata, glabra, viridi terminatum, holosericeum, fuscum, maculis glabris polymorphis, limbo viridi-luteolo circumdatis pectore pulchrè pictum. Stigma brevissimum, nec flexuosum. Reliqua omnino ut in *O. apifera*.

278. *OPHRIS aranifera*: bulbis subrotundis; scapo folioso; labio convexo, utrinque subextuberante; lobo medio emarginato, mutico.

O. aranifera. Engl. Bot. tab. 65.

In collibus *al Lagazzo*, supra *Oreggina*, extra portam *degli Angeli*. *Peren.*

Petala pallidè viridia, seu coloris herbacei, quandoque rosea, nervis saturatè viridibus. Opercula petalis paullo minora, quod non in antecedentibus. Labium convexum, utrinque protuberantia conica vix sensibili, et quæ sæpe deest, bilobum, vel quadrilobum, nullâ appendiculâ terminatum, aut si qua est, vix ramentum; cæterum labium extus holosericeum, fuscum, vel fuscè virens, maculis pectoralibus elongatis, glabris, interdum limbo albido distinctis -- Reliqua ut in *O. adrachnitide*.

279. *OPHRIS speculum*: bulbis subrotundis; scapo folioso; labio convexo, elongato, simplici, sursum incurvo; anticè maculâ solitariâ.

Ophris arachnites g. *speculum*. I. *Duraz. Catal. del Giard. dello Zerb. an. 1804. pag. 20.*

In collibus *al Lagazzo*, et secus aquæductum *dello Zerbino*. *Peren.*

Petala, et opercula ut in *O. adrachnitide*. Labium magis quàm in *O. apifera*, *adrachnitide*, et *aranifera* elongatum, convexum, sive margine deflexo, et simul leniter sursum curvum, ideoque cymbiforme, protuberantiis lateralibus omnino destitutum, bilobum, vel senio quadrilobum, brevi appendiculâ sursum versa terminatum, holosericeum, et nigro-purpurascens, anticè, et quâ magis concavum est, macula unica, pallidiori, nitida, glabra (*speculum*) insignitum. Reliqua ut in superiore.

Vulgò flos iste pulcherrimus appellatur *Uc-*

cellino allo Specchietto, a stigmate, quæ avicula, in maculam, seu speculum, inclinato. Hinc triviale nomen appositè indidit D. GRIOLET.

280. *SERAPIAS lingua*: bulbis subrotundis; petalis cucullatis; labio trilobo, basi in callum extuberante.

Serapias lingua β. *Sp. pl.* 1344.

S. lingua α. *Savi Pis.* 2. p. 304.

Ubique in collibus Genuensibus cum sequenti. *Peren.*

Flos minor quàm in *S. cordigera*. Petala conglutinata, apicibus liberis, in cucullum acuminatum, inclinatum efformata, pallidè rubella, striis longitudinalibus saturatioribus. Opercula intra cucullum, contra petalorum suturas, parva, plana, infernè libera, supernè prælongis apicibus cucullo connata, ejusdem coloris ac petala. Labium trilobum, basi extuberans in callum supernè atro-rubrum, limbo album. Lobi laterales breves, rotundati, sursum versi, et cucullum paullulum subeuntes, atro-rubri. Lobus medius dependens, angustus, prælongus, lanceolatus, acuminatus, supra pubescens, venosus, colore florum *Amygdali persicae*. Machinula genitalis inclinata, aviculæ caput referens, rostro sive stigmate longo, recto, nec flexuoso.

281. *SERAPIAS cordigera*: bulbis subrotundis; petalis cucullatis, labio trilobo, basi canaliculato.

S. cordigera. *Sp. pl.* 1345.

S. lingua β. *Savi Pis.* 2. p. 304.

Cum præcedenti : *Peren.*

Flores quadruplo majores quàm in præcedenti, coloris rubro-lateritii pallentis, striis longitudinalibus saturatioribus. Opercula atro-rubra, concava, margine crispula. Totum labium rubro-lateritium, supernè villosum, basi canaliculatum, canaliculi parietibus atro-rubris; quibus tantum notis differt a *S. lingua* β . Variat hæc species caule altiore, labii lacinia media angustiore, lobis lateralibus saturatius rubris, quibus notis proximior fit *S. linguae*, sed labio basi canaliculato perpetuò distincta.

MONOECIA TRIANDRIA.

282. *CAREX cuspidata*: culmo subanguloso; spiculis congestis, terminalibus, distinctis, acuminatis; foliis canaliculatis, strictis. *N. Soc. Med. d' emul. di Gen. tom. 2. prim. quad. pag. 145.*

C. alpina minima, caule trilatero, capitulis in summitate caulis atro-fuscis, squamis angustis, capsulis non marginatis in longiusculum collum magis bifidum attenuatis. *Mich. N. P. G. pag. 68. n. 5. tab. 33. fig. 6.*

Copiosè in *Albaro al Paradiso* ante ædes *Saluzzo*. *Peren.*

Radix repens, tecta squamis. Folia linearia, acuminata, canaliculata, stricta, rigida, striata, glabra, margine deorsum, ductis digitis, scabra, lætè viridia, vel in apricò orta supra pallida, subtus viridia, imum culmum per duos tresve pollices vaginantia, nunc illo longiora, nunc ali-

quantulum breviora , inferiora successive minora . Culmus erectus , tenuis , interdum in latus curvus , nunc exactè triquetter , nunc obscure , et fere anceps , striatus , glaber , a tribus quatuorve pollicibus , ad pedem longus , supernè nudus . Spiculæ tres , quatuor , congestæ in culmi apice , distinctæ , sessiles , ovato-lanceolatæ , acuminatæ , androgynæ , staminibus superioribus . Bracteæ ovatæ , acuminatæ , atro-fuscæ , nervo dorsali viridi , in bractea inferiori interdum , nec semper , in folium variæ longitudinis , cæterum reliquis foliis simile , producto . Glumæ florales ovatæ , acuminatæ , more bractearum atro-fuscæ , nervo dorsali viridi . Stamina superiorem spicularum partem occupantia , antheris linearibus flavis . Stigmata duo , longiuscula , pubescentia , intorta . Fructus extus convexus , interiori latere planus , acuminatus , bifidus , glaber , glumis brevior , vel subæqualis .

Deest in *Schkurhii Historia caricum* , monente etiam *CL. PROF. BALBIS* , cui specimina communicavi .

283. *CAREX divulsa* : spica oblonga subdecomposita , spiculis distinctis , capsulis divergentibus : ore diviso , radice fibrosa .
Good. Trans. of. Lin. Soc. 2. p. 160. n. 14. — Schkuhr Hist. Car. pag. 25. n. 12. tab. Dd. fig. 89.

Carex nemorosa fibrosa radice , caule exquisitè triangulari , spicâ longâ divulsâ seu interruptâ , capitulis solitariis , præterquam ultimo . *Mich. N. S. P. 69. tab. 33. f. 10.*

Carex nemorosa , fibrosa radice , caule exquisite triangulari , spica longa , divulsa

seu interrupta , capitulis omnibus solitariis,
Mich. N. P. G. 69. tab. 33. f. 11.

Gramen cyperoides echinata et rara spica nemorum minor. *Barrel. ic. 20. f. 2.*

Carex muricata. Desf. Atl. 2. p. 335.

Genuæ secus aquæductum *D' Oria. Peren.*

Culmus tenuis triqueter. Spiculæ inferiores remotæ, superiores contiguæ. Sæpe spica est infernè ramosa, et spiculæ disponuntur in ramis eodem ordine ac in spica primaria. Flores masculi superiores. Fructus acuminati, divaricati, dorso convexi, interiore latere plani, glumis longiores, exviridi-flavescentes, glabri. Planta cæspitosa, et passim in eodem cæspite alii culmi gerunt spicam simplicem, alii basi ramosam, ut in citatis *Michelii* iconibus.

284. CAREX *digitata*: vaginis membranaceis dimidiatis aphyllis; spicis linearibus erectis, mascula breviori; capsulis distantibus. *Schk. Hist. Car. pag. 97. n. 63. tab. H. fig. 38 -- Good. Trans. of Lin. Soc. 2. p. 166. n. 18. -- Sp. pl. 1384 -- Leers herb. tab. 16. f. 4.*

Gramen caryophyllatum montanum spica varia. *C. B. Prodr. pag. 9. cum ic -- Scheuchz. Agr. p. 448. tab. 19. fig. 14.*

Cyperoides montanum, nemorosum, caule triquetro-compresso, spicis ferrugineis tenuioribus, inter se distantibus, capsulis rarius dispositis, oblongis, turbinatis, trilateris. *Mich. N. P. G. p. 65. tab. 32. fig. 9.*

Gramen caryophyllatum polycarpon fructu triangulo. *Loes. Prus. pag. 112. n. 301. tab. 27.*

In collibus di Pegli. Peren.

Tum in hac, tum in *Carice pedata* spica foeminea suprema excedit spicam masculam terminalem. Sed in *C. digitata* spicae foemineae sunt alternae, dissitae, paucae; in *C. pedata* verò sunt approximatae, et pedem avium quodammodo referunt.

285. *CAREX pendula*: vaginis inferioribus longis subdimidiatis, superioribus subaequantibus; spicis cylindricis longissimis pendulis; capsulis ovato-oblongis punctatis, apice membranaceo subintegris. Schk.

Hist. Car. p. 132. n. 85. tab. L. fig. 60 --

Good. Trans. of Lin. Soc. 2. p. 168. n. 20.

Carex maxima. Scop. Carn. 2. p. 229. n.

1166. -- Desf. Atl. 2. p. 338 -- Savi Pis.

2. p. 325.

Gramen cyperoides spica pendula longiore.

Moris. Ox. s. 8. t. 12. f. 4.

Gr. cyperoides latifolium tipha pendula longiore. Barrel. ic. 45.

A Voltri locis humidis. D. IP. DURAZZO.

Peren.

286. *CAREX flacca*: vaginis brevissimis vel nullis, spicis cylindricis, foemineis laxis, fructiferis pendulis; capsulis obtuso-ovatis, apice integris. Schk. *Hist. Car. p. 152. n. 98. tab. O. fig. 57. -- Schreb. Spicil. Fl. Lips. append. n. 669.*

Cyperoides foliis caryophyllæis, caule exquisitè triangulari, spicis habitioribus, squamis curtis, obtusè mucronatis, capsulis turbinatis, brevibus, confertis. Michel. N.

P. G. 62. tab. 32. fig. 12. Herb. Michel.

D. SAVI.

Carex glauca. Scop. Carn. 2. ed 2. p. 223. n.

1151 -- *Pollich Palat. 2. p. 594. n. 894.*
Carex Micheliana. Smith Trans. of Lin. Soc.
5. p. 270. n. 4?

In collibus Genuensibus ubique. *Peren.*

Radix repens, tecta squamis. Folia linearia, acuminata, carinata, striata, margine scabra, vaginantia, ex-viridi glauca. Culmus erectus, obtusè triqueter, striatus, rarò hinc sulcatus, semipedem, duos pedes longus, glaber, glaucus, angulis interdum scabris, infernè per duos, tresve pollices foliosus. Culmus supernè gerit tres-quinque spicas cylindricas, alternas, plus minus inter se se dissitas. Una -- tres ex superioribus sunt masculæ, reliquæ fœmineæ, tenuiores, fructificationis tempore sæpius pendulæ, altera ex intermediis interdum androgyna. Spicæ inferiores sunt semper suffultæ pedunculis nudis, filiformibus, unum duos pollices longis; reliquæ pedunculo successivè breviorè gaudent, ita ut superiorum aliquæ sint sessiles. Interdum prælongus pedunculus spicam fœmineam sustinens prodit e vagina supremi folii caulini. Bracteæ auriculæ utrinque unâ, rubro -- purpureâ ad basim sæpius auctæ, rarò brevissimè vaginantes. Bractea inferior semper abit in longum folium, radicalibus simile, reliquæ sunt longè minores, ita ut supremæ tum formâ, tum colore non distinguantur a glumis. Glumæ ovatæ, florum masculorum maximè obtusæ, fœmineorum sæpius, nec semper, acutæ, omnes glauco-purpureæ, stria dorsali lutea, vel viridi, non tamen perenni. Fructus ovati, obtusi, compressiusculi, sub-

vesiculosi , glabri , vel tenuissimè pubescentes , albidì , maturi nigrescentes ; glumis sublongiores. Stigmata tria. Tota planta glauca.

287. *CAREX montana*: spicis fœmineis sessilibus subsolitariis ovatis masculæ approximatis , culmo nudo , capsulis pubescentibus.

Sp. pl. 1385--*Leers Herb. tab.* 16. *fig.* 6.

C. pilulifera . *Good. Trans. of Lin. Soc.* 2. p. 190. n. 37. , nec Schk.

Ad radices montis *Ramazzo* cum *Primula elatiore* locis humidiusculis. *Peren.*

Foliorum vaginæ ad culmi basim rubentes .

Folia interdum pubescentia. Spicæ fœmineæ sessiles , eorum bracteæ nullimodè vaginantes , aut rarò vaginulâ brevissimâ donatæ. Fructus pauci , maturitate divaricati , oblongi , obscure triquetri , acuti , ore indiviso , pubescentes. Glumæ omnes atrofuscae , obtusæ , præcipuè inferiores. Spicæ fœmineæ una , plures , approximatae , altera statim sub mare , florentes oblongæ , fructificantes globulosæ ob divaricationem capsularum.

Carex montana , *praecox* , *verna* , *pilulifera* , *ciliata* Schk. non satis adhuc , meo iudicio , ab illustri auctore fuerunt distinctæ.

288 *CAREX gynobasis*: spicis fœmineis paucifloris , sessilibus masculæ approximatis , inferiori radicali longè pedunculata ; capsulis pyriformibus apice integris. *Schk. Hist. Car.* p. 92. n. 59. *tab. G. fig.* 35.

Carex n. 1385. *Hall. Hist. Stirp. Indig. Helv.* 2. p. 193--*App.* 2. ad *Scheuchz. Agrost.* pag. 43. n. 14.

Carex alpestris. Allio. Ped. 2. p. 270. n. 2329.

Auct. ad Fl. Ped. p. 48.

Nil frequentius in collibus supra *Oreggina*.
Peren.

Folia linearia, acuminata, striata, non rigida, canaliculata, recurva, basim scapi, et pedunculorum radicalium per unum duosve pollices vaginantia; inferiora successivè minorà. Scapus erectus, palmaris, tenuis, supernè nudus, obscure angulosus, subcompressus, hinc leviter sulcatus, deorsum strictu scabriusculus, apice sustinens spicam marem, 3--6 lineas longam, quæ interdum fit androgyna, unum alterumve flosculum fœmineum basi habens. Sæpe quoque adsunt una vel duæ spicæ fœmineæ, altera statim sub mare, altera sex decem lineas a priore distans. Bractea spicarum fœminearum, vel flosculi fœminei inferioris in spica androgyna auriculis spadiceis basi instruitur, abitque in foliolum viride, nunquam excedens spicam marem. Spicæ fœmineæ vel sessiles, vel suffultæ pedunculo bi--quadrilinerari, plus minus vaginato. Statim a radice unâ cum scapo oriuntur unus plures pedunculi filiformes, supernè nudi, culmo breviores, singuli exeuntes e vagina singuli folii, apice gerentes spicam fœmineam nudam paucifloram. Glumæ ovato--oblongæ, acutæ, dorso virides, idque magis in fœminis, lateribus ruffo--ferrugineis, idque magis in maribus, margine sæpius albo--scariosæ. Fructus, oblongi, obscure triquetri, acuti, ore indiviso, glabri, pallidè virentes, glumis subæquales. Stigmata tria.

MONOECIA PENTANDRIA.

289. *XANTHIUM spinosum* : spinis ternatis.
Sp. pl. 1400 --- *Savi Pis.* 2. p. 333.
Xanthium. *Lam. ill. tab.* 365. f. 4.
Xanthium lusitanicum laciniatum validissimis
 aculeis manitum . *Magn. Hort. reg. Mons.*
pag. 208. cum bona icone .
 Frequentissimum in littore propè *Sestri di*
Ponente , *Pegli. Ann.*

DIOECIA TRIANDRIA.

- 290 *OSYRIS alba.* *Sp. pl.* 1450--*Savi Pis.* 2.
 p. 366--*Desf. Atl.* 2. p. 363.
Osyris. *Lam. ill. tab.* 802. mas.
Casia poetica *Monspeliensium* . *Lob. ic.*
 432. fœm.
 In collibus *al Lagazzo*, et *Oreggina.* *Frutex.*
 Caulis fruticosus , ramosissimus , durus , in-
 fernè teres , supernè ramisque angulosus .
 Rami virgati, virides. Folia sessilia, lanceo-
 lato-linearia, sparsa, alterna, acuta, vel ob-
 tusa. Flores in racemulis lateralibus, sæpe
 apice corymboso-fastigiatis , cum bracteis
 inæqualibus ad pedicellorum basim. Caly-
 ces e-viridi-luteoli , interdum rubelli , tri-
 quadrifidi; appendiculæ minutissimæ inter
 lacinias . Corolla deest . Stamina totidem
 quot calycis segmenta. Planta glabra, odo-
 ris ingrati.

POLYGAMIA MONOECIA.

- 291 *ANDROPOGON gryllus*: paniculæ pedun-
 culis simplicissimis trifloris , flosculo her-
 maphrodito aristato ciliato basi barbato .

Sp. pl. 1408--*Desf. Atl.* 2. pag. 378.

Andropogon. Lam. ill. tab. 840. *fig.* 1.

In collibus *al Lagazzo. Peren.*

Flos hermaphroditus solitarius, sessilis. Calyx glumis subæqualibus, ciliatis, quarum altera leviter bifida, apicibus muticis, vel subaristatis, altera subtridentata, dente medio longè aristato, supernè sæpe pilosa. Glumæ florales longitudine æquales, altera angustior, longissimè aristata, aristâ terminali geniculatâ, intortâ, altera mutica ciliata.

Flores masculi duo, pedicellati. Calyx corollâ longior, inæqualis, gluma major longius aristata, minor vix aristata, ciliata. Glumæ florales inæquales, angustæ, muticæ, ciliatæ.

Flores laxè paniculati, sæpe purpurascens. Villi aurei sub quovis thalamo, sive sub flore hermaphrodito.

292 ANDROPOGON *distachyon*: spicis binis terminalibus, culmo indiviso. *Sp. pl.* 1481.

Andropogon n. 1. Gerar. Gallopr. p. 106. *tab.* 3. *f.* 2.

Gramen bicornè seu distachyophorum *Bocc.*

Sic. pag. 20. *tab.* 11. *fig.* 1. A.

In collibus *al Lagazzo.*

Culmus semipedem, duos pedes altus, erectus, tenuis, geniculatus, simplex, viridis vel purpurascens. Folia linearia, angusta, glabra, vel pilosa, margine deorsum scabra, longè arctèque vaginantia. Stipulæ obtusiusculæ, superiores in longa cilia sphacelatæ. Spicæ duæ, terminales, furcatæ, ad exortum pilis obsessæ, altera sessilis, altera breviter pedunculata, unaquæque semicylindrica, latere interiore plano, subvigintiflora, duos

circiter pollices longa. Flosculi binati; hermaphroditus sessilis, masculus pedunculatus. Ad eorum exortum pili albidj.

Fl. hermaphr. Calyx inæqualis; gluma major lanceolata, margine inflexo, bifida, segmentis inæqualibus muticis, dorso viridis vel spadicea præcipuè ad apicem, limbo albo-scariosa; gluma minor corollam vix superans, apice subtridentata, dente medio producto in aristam tenuem, tres quatuor lineas longam, tota albo-scariosa, ciliata. Glumæ florales subæquales, albo-scariosæ, acuminatæ, angustæ, exterior bipartita, emittens e sinu aristam pollicarem, geniculatam, sub geniculo fuscam, supra exalbido-purpurascentem; gluma interior mutica ciliata. Stamina tria, antheris linearibus, primùm purpureis, dein luteis. Stigmata duo plumosa, et purpurascentia.

Fl. masc. Pedicellus compressus, supernè latior, basi, et lateribus pilosus. Calycis glumæ inæquales, corollâ longiores; maior viridis, vel ex-viridi-purpurascens, margine albido-scariosa, apice subtridentata, dente medio producto in aristam bi-trilinearem tenuem; minor mutica, ciliata, albo-scariosa. Glumæ florales subæquales, angustæ, albo-scariosæ, muticæ, altera acuminata, glabra, altera margine ciliata.

293. ANDROPOGON *hirtum*: paniculæ spicis conjugatis, calycibus hirsutis. *Sp. pl.* 1482.
— *Desf. Atl.* 2. p. 378.

Gramen dactylon siculum, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis. *Pluk. Phyt. tab.* 92. fig. 1.

Genuæ in collibus *al Lagazzo*. Frequentior
a *Pegli*. *Peren*.

Culmus a sesquipede ad quatuor pedes altus,
geniculatus, ramosus. Folia linearia, angu-
sta, striata, glauca, margine deorsum sca-
bra, pilis longis et raris, præcipuè basim
versus adspersa, breviter vaginantia. Stipu-
la truncata, erosa, angulis lateralibus elon-
gatis. Flores in panicula composita, ramis
axillaribus, more pedunculorum infernè
vaginatis. Pedunculi axillares, et terminales,
apice distachii, supernè longis, patentibus-
que pilis hirti. Spicæ lineares, subpollica-
res, altera sessilis, altera pedunculata. Flo-
sculi binati, viridi--purpurascens, herma-
phroditus sessilis, masculus pedicellatus,
muticus. Rachis pilosa.

Fl. Hermaph. Glumæ calycinæ æquales mu-
ticæ, pilis longis, et candicantibus hirsu-
tæ. Glumæ florales inæquales, albo--scario-
sæ; major calyce aliquantulum brevior, cilia-
ta, mutica; minor angustissima, bidentata,
ex sinu dentium emittens aristam genicu-
latam, octo circiter lineas longam. Anthe-
ræ luteæ. Stigmata plumosa purpurascens.

Fl. Masc. Pedicellus compressus, lateribus
et basi pilis albis adpersus. Glumæ caly-
cinæ vix inæquales, villis albis hirsutæ.
Glumæ florales angustæ, calyce paullulum
breviores, subinæquales, albo--scariosæ, bre-
vior apice sphacellata.

Planta bifera, vernalis, et autumnalis.

294. ANDROPOGON *ischaemum*: spicis digi-
tatis plurimis, flosculis sessilibus, aristato
muticoque, pedicellis lanatis. *Sp. pt.* 1483.

-- *Savi Pis. 2. p. 386* -- *Jacq. Austr. 4. tab. 384.*

Gramen dactylon , spicis villosis . *Scheuchz. Agr. p. 94. n. 1.*

Genuæ in mœniis , et in montibus inter *lo Sperone*, et *il Diamante*. *Peren.*

295. *HOLCUS halepensis*: glumis glabris , floribus hermaphoditis muticis, fœmineo aristato. *Sp. pl. 1485* -- *Savi Pis. 2. p. 388.*

Gramen arundinaceum halepense , tragopogonis folio paniculâ miliaceâ. *Pluk. Phyt. tab. 32. fig. 1.*

Genuæ in vineis *allo Zerbino*. *Peren.*

296. *HOLCUS lanatus*: glumis bifloris villosis: hermaphrodito mutico , masculo aristâ recurvâ. *Sp. pl. 1485* -- *Desf. Atl. 2. p. 381.*
-- *Leers Herb. tab. 7. fig. 6.*

Gramen pratense paniculatum molle C. B. *Scheuchz. Agr. p. 234. n. 2. tab. 4. fig. 24. A. B.*

Ubique locis gramineis. *Peren.*

Flos masculus aristatus, aristâ primùm rectâ, dein recurvâ. Flos hermaphroditus muticus.

Tota planta molliter villosa. Panicula sæpe purpurascens.

297. *CENCHRUS racemosus*: panicula spicata, glumis muricatis setis ciliaribus , *Sp. pl. 1487.*

Gramen caninum maritimum asperum. C. B. *Prod. p. 2. cum ic.*

Gramen caninum maritimum spicatum, echinatis glumis. *Barrel. ic. 718.*

Tragus racemosus. *Desf. Atl. 2. p. 386.*

Lappago racemosa. *Willd. Sp. pl. 1. p. 484.*

Genuæ in mœniis *Feritorem* versus , a *Sestri*

di Ponente in littore, a *Pegli* secus vias :
Peren.

298. *ATRIPLEX alba* : foliis cuneato--ovatis ,
eroso--dentatis ; floribus axillaribus sessi-
libus , glomeratis ; calycibus fructus trian-
gularibus , planis , margine argutè serrula-
tis. *Soc. med. d' Emul. di Gen. tom. 2.*
prim. quadr. p. 141.

Atriplex marina incana. *Bocc. Herb. Lig.*
tom. 2. c. 80.

A Sestri di Ponente in littore , et in margi-
nibus viarum. *Ann.*

Caulis ex--decumbenti--erectus, duos vel tres
pedes longus , ramosus , leniter flexuosus ,
sulco utrinque uno e ramorum basi decur-
rente exaratus , hinc e--tereti--obscurè--an-
gulosus. Folia alterna, ovato--oblonga , ba-
si cuneata , integra , reliquo margine ero-
so--denticulata, inferiora breviter petiolata,
superiora sessilia , minora. Flores axillares,
sessiles , glomerati, in summo caule , ramis-
que spicati, nudi. Calyces fructiferi trian-
gulares , plani , majusculi , magis lati quam
longi , margine denticulis acutis inæquali-
bus , terminali majore , serrulati ; calycul-
us utrinque unus sterilis minor , serrula-
tus , conferruminatus tuberculorum latera-
lium vicem gerit , interdum verò deest .
Semen solitarium. Tota planta albo polline
incana .

Hæc est *Atriplex rosea* nonnullorum Botanico-
rum ; sed ubi in nostra planta fructus
quadrangulares definitionis Linnaeanæ ?
Insuper *Linn.* tulit ad suam speciem *Atri-
plicem sylvestrem fructu compresso roseo
vel stellato.* *C. B. Prodr. 58.* , cujus calyx

fructifer longè distat a superius descripto,
 ut videre est ex ipsius *C. Bauhini* ver-
 bis : “ is (fructus) in medio leviter extu-
 „ berat , quatuor aliis extuberantiis in cir-
 „ cumferentia adpositis, quas tamen sinus
 „ leves intercedunt, ea planè forma , qua
 „ rosæ depressæ in quorundam nobilium
 „ insigniis pingi consuevere : in singulis
 „ quatuor extuberantiis , semen compres-
 „ sum, mediocris magnitudinis continetur,
l. c. cap. 22. n. 1.

CRYPTOGAMIA FILICES.

299. *OSMUNDA regalis* : frondibus bipinnatis,
 apice racemiferis. *Sp. pl.* 1521. — *Savi*
Pis. 2. p. 404 — *Desf. Atl.* 2. p. 399 —
Engl. Bot. tab. 209.

Osmunda. *Lam. ill. tab.* 865. fig. 2.

Filix florida major non dentata. *Moris. Ox.*
s. 14. tab. 4. f. 1.


Frequens secus *Leira a Voltri.*

300. *OSMUNDA spicant*: frondibus lanceolatis,
 pinnatifidis: laciniis confluentibus integer-
 rimis parallelis. *Sp. pl.* 1522.

Lonchitis aspera. *Dod. Pempt.* 469.

In via inter *Voltri*, et *l'Acqua Santa* ; tum
 in orientali plaga *Liguria* prope *Rapallo*
 ad radices montis *Rua* in viæ marginibus.

Frons ob pinnulas decrescentes untrunque at-
 tenuata , sed infernè longiùs , ibique pin-
 nulæ sunt rotundiores , similes illis *Asple-*
nii caterach.



EMENDANDA.

Pag. 41. n. 83. Ex seminibus postea visis, et ex icone *Engl. Bot.* patuit hinc intellectam speciem esse *Chenopodium urbicum* L., ideo sequentia synonyma subrogentur.

CHENOPODIUM *urbicum* : foliis triangularibus denticulatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis subaphyllis. *Smith Fl. Brit.* 1. p. 273 -- *Engl. Bot. tab.* 717 -- *Sp. pl.* 318.

In littore *al Deserto* prope *Sestri di Ponente*; *Genuæ* in mœniis *alla Darsena. Ann.*

Folia basi integra, et cuneata, sed non adeo longè ut in *C. rubro*, reliquo margine eros-- denticulata. Semina quinquies majora quàm in *C. rubro*, in quo sunt minutissima sabuli tenuioris ad instar (*).

F I N I S.

(*) " This is one of the most difficult to ascertain of all our British species of *Chenopodium*, and i confess myself entirely obliged to Mr. Curtis in his *Fl. Lond. fasc. 6. tab. 21.* for a decisive mark to distinguish it from *rubrum*, which consists in the ripe seeds of the latter being no larger than grains of writing sand, whereas those of the plant now before us are at least five times that size, or about as rape seed. " *Engl. Bot. n. 717.*

INDEX.

- A**
Achilea Ligustica. p. 115.
millefolium. 114.
Agrimonia Eupatoria. . 63.
Agrostis vulgaris. 10.
stolonifera 10.
Alisma plantago. 57.
Allium album 51.
carneum. 51.
paniculatum. 50.
sphærocephalon. . 49.
triquetrum. 51.
Alyssum maritimum. . 77.
Anagallis arvensis α , β . 36.
Anemone hortensis, . . 68.
nemorosa 68.
trifolia. 68.
Andropogon distachyon 134.
gryllus. 133.
hirtum. 135.
ischæmum. 136.
Anthericum liliago. . . 54.
Anthoxanthum odoratum. 5.
Antirrhinum linaria. . . 74.
spurium. 74.
Arenaria marina β . . . 62.
Arundo ampelodesmon . 23.
Asclepias vincetoxicum. 41.
Asparagus acutifolius . . 55.
Aster acris. 111.
Astragalus monspessulanus. 91.
Athamanta cervaria. . . 44.
Atriplex alba. 138.
Avena fatua 21.
flavescens. 23.
sterilis. 22.
- B**
Bellis perennis 113.
Betonica officinalis. . . 72.
Biscutella lævigata. . . 78.
Briza maxima 16.
Bromus erectus. 19.
distachyos. 21.
mollis. 19.
pinnatus. 21.
sterilis. 20.
sylvaticus 20.
Bunias cakile. 78.
- C**
Campanula glomerata. . 37.
Capparis spinosa. 67.
Cardamine hirsuta. . . 78.
Carduus acaulis. 109.
arvensis 109.
lanceolatus. 108.
pycnocephalus. 108.
Carex cuspidata. 126.
digitata. 128.
divulsa. 127.
flacca. 129.
gynobasis 131.
montana. 131.
pendula 129.
Carlina caulescens. . . 110.
vulgaris 110.
Catananche coerulea . . 106.
Cenchrus racemosus . . 137.
Centaurea aspera. . . 118.
bracteata. 117.
montana. 115.
paniculata 116.
scabiosa 117.
Cheiranthus incanus. . . 79.

Chenopodium urbicum. 140.	Euphorbia characias . . 65.
polyspermum. . . 41.	cyparissias. . . . 65.
Chrysanthemum Achilleæ 114.	epythymoides . . 65.
Cineraria maritima . . 113.	exigua 64.
Cistus fumana 68.	paralia 65.
Clinopodium vulgare. . 72.	peplis 63.
Cochlearia draba. . . . 77.	spinosa 64.
Colchicum autumnale . 57.	Euphrasia lutea . . 74.
Convolvulus cantabrica. 36.	officinalis 73.
Cornus sanguinea . . . 34.	F
Coronilla emerus . . . 90.	Ferula sulcata . . . 46.
Crepis foetida 103.	Festuca duriuscula . . 17.
præcox 103.	phleoïdes 17.
Crithmum maritimum. 46.	Frankenia pulverulenta. 56.
Cynoglossum omphalodes 36.	Fumaria capreolata. . 88.
Cynosurus aureus . . . 16.	G
Cyperus longus. 7.	Galanthus nivalis. . . 49.
Cytisus laburnum . . . 88.	Galeopsis ladanum. . 72.
sessilifolius 88.	Gallium molugo . . . 30.
supinus 89.	lucidum. 31.
triflorus 89.	rubrum 31.
D	Genista januensis . . 85.
Dactylis glomerata. . . 16.	pilosa 84.
Daucus carota 42.	Geranium molle . . . 81.
gummifer 34.	nodosum 81.
Dianthus carthusianorum 61.	rotundifolium β. . 82.
Dictamnus albus 60.	sanguineum. . . . 82.
Draba verna 75.	Glaucium luteum . . . 67.
E.	Globularia vulgaris . . 27.
Echinophora spinosa . . 42.	H
Epilobium angustissimum 57.	Hedera helix. 40.
Erica arborea. 57.	Hedysarum onobrychis. 91.
carnea. 57.	Heliotropium Europæum 35
vulgaris 57.	Helleborus foetidus. . 70.
Erigeron viscosum. . . 111.	viridis 70.
Erodium malacoides . . 81.	Hieracium sylvaticum . 102.
Eryngium maritimum . 42.	Hippocrepis comosa. . 91.
Erysimum officinale . . 79.	Holcus Halepensis . . 137.
Erythronium dens canis β. 52.	lanatus 137.
Eupatorium cannabi-	Hordeum bulbosum . . 25.
num 110.	murinum 25.

Hyacinthus comosus 55.	apifera 122.
racemosus 55.	aranifera 123.
Hyosciamus albus 39.	speculum 124.
Hyoseris radiata 104.	spiralis 121.
rhagadioloides 104.	Orchis conopsea 121.
Hypochæris maculata . 106.	morio 118.
I.	pallens β 120.
Iberis umbellata 77.	papilionacea 118.
Inula dysenterica 112.	sambucina 121.
hirta β 113.	ustulata 119.
spiræifolia 112.	variegata 119.
Iris pseudacorus 6.	Origanum vulgare 72.
L.	Ornithogalum narbonense 53
Lathyrus sylvestris 87.	umbellatum 53.
Leontodon hirtum 101.	Osmunda regalis 139.
hispidum γ 102.	spicant 130.
taraxacum 100.	Osyris alba 133.
tuberosum 101.	P.
Lepidium iberis 76.	Panicum crus galli 8.
petræum 76.	dactylon 9.
Linum gallicum 49.	verticillatum 8.
viscosum 47.	viride 8.
Lolium perenne 24.	Peucedanum officinale β . 45
Lotus corniculatus 96.	Phalaris aquatica minor . 7.
hirsutus 96.	canariensis 7.
M.	Phleum crinitum 9.
Medicago marina 96.	Picris echioides 99.
polymor. rigidula . 97.	hieracioides 99.
Melica cœrulea 11.	Plantago coronopus . . . 34.
nutans 11.	lanceolata 33.
Mentha hirsuta 71.	psyllium 34.
rotundifolia 71.	serpentina 33.
Milium lendigerum 9.	Plumbago europæa 36.
Myagrum hispanicum . 75.	Poa angustifolia 15.
rugosum 74.	annua 15.
sativum 75.	bulbosa γ , β 13.
O.	fluitans 12.
Ononis foetens 86.	rigida 13.
minutissima 86.	Polycarpon tetraphyllum . 27.
Ophris adrachnites . . . 123.	Polygala vulgaris 83.
antropophora 122.	Polygonum convolvulus . 59.

maritimum	59.	Sinapis arvensis	80.
Potentilla verna	67.	Sisymbrium nasturtium	79.
Primula elatior	35.	Sium nodiflorum	47.
Prunella vulgaris <i>B</i>	73.	Solidago virgaurea	112.
Pyrus aria	66.	Sonchus arvensis	99.
R.		oleraceus	99.
Ranunculus bulbosus	70.	tenerrimus	100.
ficaria	70.	Spartium junceum	84.
Reseda lutea	63.	spinosum	84.
Rotbolla incurvata	24.	Spiræa filipendula	66.
Rubia tinctorum	32.	Stæhelina dubia	110.
S.		Stellaria media	62.
Sagina apetala	35.	T.	
Salsola tragus	41.	Thalictrum minus	70.
Salvia glutinosa	5.	Thesium linophyllum	40.
verbenaca	4.	Thlaspi Bursa pastoris	77.
Samolus valerandi	40.	Thymus nepeta	72.
Saponaria ocymoides	61.	Tormentilla officinalis	67.
vaccaria	60.	Tragopogon dalechampii	97.
Satureja montana	71.	picroides	98.
Scabiosa arvensis	28.	Tribulus terrestris	60.
columbaria	29.	Trifolium officinale	92.
leucantha	28.	medium	93.
pyrenaica	29.	montanum	95.
Scandix australis	47.	rubens	93.
Schoenus mucronatus	6.	stellatum	95.
nigricans	6.	Triticum festucoides	25.
Scilla autumnalis	54.	lohiaceum	26.
italica	53.	Turritis sagittata	79.
Scolymus maculatus	107.	V.	
Scorpiurus subvillosa	90.	Valeriana rubra	6.
Scorzonera picroides	98.	Verbascum sinuatum	39.
Selinum austriacum	44.	Verbena officinalis	4.
Senecio vulgaris	111.	Veronica cymbalaria	3.
Serapias cordigera	125.	hederifolia	3.
lingua	125.	Vicia hybrida	88.
Seriola æthnensis	105.	sativa	88.
Sesleria coerulea	12.	Viola canina	38.
Sherardia arvensis	30.	odorata	38.
Silene inflata	62.	X.	
nocturna	62.	Xanthium spinosum	133.

ERRATA.

CORRIGE.

pag.	lin.		
3.	14.	cœterum	cœterum
4.	1.	cœterum	cœterum
5.	15.	aeuminata	acuminata
10.	21.	corpusculis, scabrâ	corpusculis scabrâ.
10.	26.	quo elapso	quo elapso ,
12.	10.	cœrulea	cœrulea
12.	12.	culmorum	culmorum
12.	20.	arundinaceum	arundinaceum
15.	1.	bulbosæ	bulbosæ
22.	32.	circundata	circumdata
24.	4.	<i>Willd.</i>	<i>Willd.</i>
24.	15.	cœrclescunt	cœrulescunt
29.	33.	<i>Willd.</i>	<i>Willd.</i>
36.	24.	<i>Frnc.</i>	<i>Franç.</i>
35.	17.	fœcundationis	Fœcundationis .
50.	25.	piramidalis	pyramidalis
51.	2.	albid o	albido
51.	4.	ref e	refe-
56.	3.	<i>Franc.</i>	<i>Franç.</i>
71.	21.	<i>Franc.</i>	<i>Franç.</i>
82.	14.	setulâ rubrâ bre- vissimâ	setulâ brevissimâ
83.	29.	<i>Oregina</i>	<i>Oreggina</i>
109.	31.	exiguus	exiguus
110.	6.	<i>Franc</i>	<i>Franç.</i>
110.	28.	enpatorium	eupatorium
114.	24.	Pedunculi	Pedunculi
119.	9.	variegatus	variegato
123.	6.	pulchrins	pulchrius
127.	34.	N. S. P.	N. P. G.

ERRATA

100. 100.	100. 100.
101. 101.	101. 101.
102. 102.	102. 102.
103. 103.	103. 103.
104. 104.	104. 104.
105. 105.	105. 105.
106. 106.	106. 106.
107. 107.	107. 107.
108. 108.	108. 108.
109. 109.	109. 109.
110. 110.	110. 110.
111. 111.	111. 111.
112. 112.	112. 112.
113. 113.	113. 113.
114. 114.	114. 114.
115. 115.	115. 115.
116. 116.	116. 116.
117. 117.	117. 117.
118. 118.	118. 118.
119. 119.	119. 119.
120. 120.	120. 120.
121. 121.	121. 121.
122. 122.	122. 122.
123. 123.	123. 123.
124. 124.	124. 124.
125. 125.	125. 125.
126. 126.	126. 126.
127. 127.	127. 127.
128. 128.	128. 128.
129. 129.	129. 129.
130. 130.	130. 130.
131. 131.	131. 131.
132. 132.	132. 132.
133. 133.	133. 133.
134. 134.	134. 134.
135. 135.	135. 135.
136. 136.	136. 136.
137. 137.	137. 137.
138. 138.	138. 138.
139. 139.	139. 139.
140. 140.	140. 140.
141. 141.	141. 141.
142. 142.	142. 142.
143. 143.	143. 143.
144. 144.	144. 144.
145. 145.	145. 145.
146. 146.	146. 146.
147. 147.	147. 147.
148. 148.	148. 148.
149. 149.	149. 149.
150. 150.	150. 150.
151. 151.	151. 151.
152. 152.	152. 152.
153. 153.	153. 153.
154. 154.	154. 154.
155. 155.	155. 155.
156. 156.	156. 156.
157. 157.	157. 157.
158. 158.	158. 158.
159. 159.	159. 159.
160. 160.	160. 160.
161. 161.	161. 161.
162. 162.	162. 162.
163. 163.	163. 163.
164. 164.	164. 164.
165. 165.	165. 165.
166. 166.	166. 166.
167. 167.	167. 167.
168. 168.	168. 168.
169. 169.	169. 169.
170. 170.	170. 170.
171. 171.	171. 171.
172. 172.	172. 172.
173. 173.	173. 173.
174. 174.	174. 174.
175. 175.	175. 175.
176. 176.	176. 176.
177. 177.	177. 177.
178. 178.	178. 178.
179. 179.	179. 179.
180. 180.	180. 180.
181. 181.	181. 181.
182. 182.	182. 182.
183. 183.	183. 183.
184. 184.	184. 184.
185. 185.	185. 185.
186. 186.	186. 186.
187. 187.	187. 187.
188. 188.	188. 188.
189. 189.	189. 189.
190. 190.	190. 190.
191. 191.	191. 191.
192. 192.	192. 192.
193. 193.	193. 193.
194. 194.	194. 194.
195. 195.	195. 195.
196. 196.	196. 196.
197. 197.	197. 197.
198. 198.	198. 198.
199. 199.	199. 199.
200. 200.	200. 200.

12
at
wy
11/11
tat
ta
ali
i

hermaphrodito aristato ciliato basi barbato.

Sp. pl. 1408--*Desf. Atl.* 2. pag. 378.

Andropogon. Lam. ill. tab. 840. fig. 1.

In collibus al *Lagazzo. Peren.*

Flos hermaphroditus solitarius, sessilis. Calyx glumis subæqualibus, ciliatis, quarum altera leviter bifida, apicibus muticis, vel subaristatis, altera subtridentata, dente medio longè aristato, supernè sæpe pilosa. Glumæ florales longitudine æquales, intortæ, altera mutica ciliata.

Flores masculi duo, pedicellati. Calyx corollæ longior, inequalis, gluma major longius aristata, minor vix aristata, ciliata. Glumæ florales inæquales, angustæ, muticæ, ciliatæ.

Flores laxè paniculati, sæpe purpurascens. Villi aurei sub quovis thalamo, sive sub flore hermaphrodito.

29 2 ANDROPOGON *distachyon*: spicis binis terminalibus, culmo indiviso. *Sp. pl.* 1481.

Andropogon n. 1. Gerar. Gallopr. p. 106. tab. 3. f. 2.

Gramen bicornè seu distachyophorum *Bocc.*

Sic. pag. 20. tab. II. fig. 1. A.

In collibus al *Lagazzo.*

Culmus semipedem, duos pedes altus, erectus, tenuis, geniculatus, simplex, viridis vel purpurascens. Folia linearia, angustà glabra, vel pilosa, margine deorsum scabra, longè, arctèque vaginantia. Stipulæ obtusiusculæ, superiores in longa cilia sphacelatae. Spicæ duæ terminales, furcatae, ad exortum pilis obsessæ altera sessilis, altera breviter pedunculata, unaquæque semicylindrica, latere interiори plano, subviginthiflora, duos

r6

15

TII 15 T L L S 15

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12

12


TP II.

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11



Bertoloni, Antonio,

Plantae genuenses

Genua 1804

Phyt. 40

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301031-0